

From:

To:

Date: 1/26/2022 5:13:51 AM

Subject:

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГАЛІУМ-ХЕЕЛЬ
(GALIUM-HEEL®)

Склад:
діючі речовини: 100 г препарату містять: Acidum nitricum D6 – 5 г, Apis mellifica D12 – 5 г, Argentum metallicum D8 – 5 г, Aurum metallicum D10 – 5 г, Betula alba D2 – 5 г, Calcium fluoratum D8 – 5 г, Caltha palustris D3 – 5 г, Clematis recta D4 – 5 г, Echinacea D5 – 5 г, Galium aparine D3 – 4 г, Galium mollugo D3 – 4 г, Hedera helix D4 – 5 г, Juniperus communis D4 – 5 г, Ononis spinosa D4 – 5 г, Phosphorus D8 – 5 г, Pyrogenium Nosode D6 – 5 г, Saponaria officinalis D4 – 5 г, Sedum acre D3 – 5 г, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 – 5 г, Thuja occidentalis D3 – 5 г, Urtica urens D3 – 2 г;
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.
Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.
1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, злегка світло-жовтого кольору розчин зі слабким пряним запахом.

Фармакотерапевтична група.
Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.
Препарат чинить імуномодуючу, протизапальну, дезінтоксикаційну та дренажну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, що входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.
Показання. Хронічні захворювання, що часто загострюються; інфекції, що потребують стимуляції неспецифічного імунітету.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.
На початку лікування препаратом можливе короточасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Цей лікарський засіб містить 35 об. % етанолу (алкоголю), тобто 138 мг/дозу, що еквівалентно 4 мл пива, 2 мл вина у дозі.
Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям та пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально, якщо користь від застосування переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.
Разова доза: дорослим – по 10 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до прийому їжі. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу крапати під язик). Тривалість застосування лікарського засобу залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання і визначається лікарем індивідуально.
Якщо під час лікування симптоми погіршуються або покращення стану не спостерігається через 7 днів лікування, слід звернутися за консультацією до лікаря.

Діти.
Препарат рекомендований для застосування дорослим.

Передозування.
Не відзначалося.

Побічні реакції.
В осіб із підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату можливий розвиток алергічних реакцій.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання.
Спеціальних умов зберігання не потребує.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.
Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.