

From:

To:

Date: 2/3/2022 12:16:55 PM

Subject:

Attachments: .thmx

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування лікарського засобу  
ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

**Склад:**

діюча речовина: гліцерол;  
1 супозиторій містить гліцеролу 1405 мг;  
допоміжні речовини: натрію стеарат, вода очищена.

**Лікарська форма.** Супозиторії ректальні.

**Основні фізико-хімічні властивості:** безбарвні або напівпрозорі супозиторії у формі торпеди, з маслянистою, гладенькою поверхнею, однорідні на вигляд у місці розрізу, зі слабким характерним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Інші проносні засоби. Код АТХ А06А Х01.

**Фармакологічні властивості.**

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30-50 %), вазеліну, ланоліну. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас. При введенні у пряму кишку гліцеринові супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку та рефлекторним шляхом ініціюють процес дефекації.

**Фармакокінетика.**

Не визначена.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Симптоматичне лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до гліцерину або до будь-якого інгредієнта препарату. Ниркова недостатність. Синдром подразненого кишечника, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморой у стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількохгодинного інтервалу.

**Особливі заходи безпеки.**

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.  
Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.  
Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом більше 1 тижня.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не застосовувати цим категоріям пацієнтів.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати ректально по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15-20 хвилин після сніданку.  
Супозиторій вводити у пряму кишку та утримувати там протягом не менше 5 хвилин, якщо випорожнення не відбудеться раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом з каловими масами.  
Лікування запорів не повинно перевищувати 7 днів.

**Діти.** Дітям віком до 2 років препарат можна застосовувати лише у виняткових випадках після консультації з лікарем, оскільки він може погіршувати нормальну функцію рефлексу дефекації.

**Передозування.**

У разі передозування можливе часте випорожнення кишечника, рідкий кал. Це явище минає само собою після відміни препарату.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.  
При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді – катаральний проктит.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

**Упаковка.** По 6 супозиторіїв у стрипі. По 1 або 2 стрипи у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

АТ «Антибіотіче», Румунія/S.C. Antibiotice S.A., Romania.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця впровадження його діяльності.**

Вул. Валя Лупулуй, 1, м. Ясси, 707410, Румунія/Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, 707410, Romania.