

®
(ASPIRIN CARDIO®)

1

01 06.

2
5
(Ann Int Med 2002;136:161–172) 0,72 (95 % : 0,60–0,87))
5–7
0,8 % 0,48 %,
70
0,22 % 0,17 %.
().
(European Society of Cardiology)(European Heart Journal, 1998;19:1434-1503).
Antithrombotic trialists collaboration(BMJ 2002; 324: 71–85),

77000

(

,

(),

,

,

,

,).

-

(

25 %; $p < 0,0001$)

,

,

,

,

2-7

60-90 %.

80 100%.

2-3

,

15
(> 3)

,

,

(10 %).

(10 %),

(75 %)

12

().

,

,

;

,

,

;

(

,

).

,

(), ,
, ().
().

/

, . . , . .

15 / (. « « »).
(. « »).

15 / (. (.
« »).

,
15 / : , ().
(, , ,):
/ , , ,
:
,

»).

®,

®,

®);

;

(

,
,

-6-

;

,

;

,

;

,

;

,

).

®,

,

;

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

;

,

).

(> 300)

/).

⑧

,
- : 1×100 / .
: $100 - 300$ / .
(TIA):
 3×100 / 1×300 / .
30 $\frac{1}{2}-1$
: ,
: 200-300 ,
() .
100
⑧.

⑧

(18)

16 (, « »).

, , , 12-24 , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
(), , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,

, , , , ,
, , , , , (, , , , , , ,)
4 (10-
);

(pH > 8),

/100; : 1/10000 - < 1/1000; : < 1/10000. : 1/10; : 1/100 - < 1/10; : 1/1000 - < 1

(70 %);

;

;

(. « »).

/

.5

25°

14

, 2 4

Bayer BitterfeldGmbH, Germany

1, 06803

Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Germany

