

®  
**(BETADIN ®)**

1 :  
: 100 - ;  
: (85 %), 9, , , , .

X D08A G02.

- . : - . , , .  
- . , , .  
: , , , .  
, , , .

, - (SH) ( )- , *in vitro* ,  
15-30 , ,  
( ), ( ® ), ( ), ( , - ),  
( ).

35000-50000,

38 %

3,8-6 / ,  
15 60 /

- 0,01-0,5 / .

2-

(

: 100-300

1

).

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(

).

2-7.

!

)

(

( - , , , ), ' -  
1-4 .

). ( ,  
( - ) .

- , , - .

( 10 % ) ( 14 ) ( - ) .

, ( 3 ) .

- , , - ,

2-

®

2-3

\_\_\_\_\_:2  
\_\_\_\_\_:2

3  
5

-  
-

3  
5

30  
5

0,9 %

:

1.

		, /
	1:5-1:10	200 - 100 /1
	1:25	40 /1
	1:100	10 /1
	1:1000	10 /10
	1:25	4 /100
	1:2-1:20	50 - 5 /100
	1:10	10 /100



: ( ) , .

.3 .

.

25 .

30  
1000 120 , 1000

; 1 30 120 ;

.

.

,

9900, . , .

65, .

.