

O  
**(MIRTAZAPIN SANDOZ<sup>®</sup>)**

1	:	;	15	-	30	;	,	,	,	,	,	,	,	,
;	;	;		-			,	,	,	,	,	,	,	,
<u>15</u>	:	(		) -			,		(	171),		8000,		( 172),

FCF ( 110);

<u>30</u>	:	(		) -			,		(	171),		8000,		(
172),		(	172),			( 172);								

.	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>15</u>	:	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
<u>30</u>	:	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,

N06 11.

a <sub>2</sub> -	,	5-HT <sub>1</sub> -	,	S(+)	a <sub>2</sub> -	5-HT <sub>2</sub> -	,	5-HT <sub>2</sub>	5-HT <sub>3</sub> -	R(-)	5-HT <sub>3</sub> -
H <sub>1</sub> -	,	,	,								
<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>.</u>

.	,	,	,	4	4	(15-45	7-18
<u>(n = 259)</u>							
(15 , 30	45	)					

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

( 7 %)  
(11,8 %      6,8 %)

48,8 %  
(2,9 %      0 %).

( 50 %),

5,7 %

(MAO).

$$30 \quad 1 \quad , \quad , \quad ( \quad ) \quad ,$$

, CYP3A4 2 , ,

60 % 45 %

( , )

50 %

40 %

CYP3A4

AUC (

« / »)

(  
50 %.

CYP1A2, CYP2D6 CYP3A4)

CYP3A4,

, , ,

, ,

— .

, (DRESS),

®,

( ,

).  
,

,

,

, , ,

25

,

( )

).

(

65

—



( ).

\_\_\_\_\_.

, , , ,  
,

\_\_\_\_\_.

, , , ,  
,

⑧ ,

15

FCF ( 110),

, , , ,  
,

, , , ,  
PPHN , ,  
). ,

( )  
(PPHN).

(

, , , ,  
,

/

/

(

). , , ,

,

15 45 ;

- 15 30

1-2

2-4

2-4

(  
    < 40 / ).

20-40

2

1

).

6

;

(

),

(

)

,

,

,

,

(

)

QT

*torsade de pointes.*

5 %

(DRESS),

: ( 1/10), ( 1/100, ( < 1/10), ( 1/1000, < 1/100), ( 1/10000, < 1



10

; 2 ( $10 \times 2$ )

1, 39179,