

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПОСТЕРИЗАН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 супозиторій містить 387,10 мг стандартизованої суспензії культури бактерій (містить $6,6 \times 10^8$ E.coli, убитих і законсервованих у 6,6 мг зрідженого фенолу);

допоміжні речовини: твердий жир, олія рицинова поліетоксильована, гідрогенізована.

Лікарська форма. Супозиторії.

Однорідні супозиторії, від білого до бежевого кольору, з характерним запахом фенолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ, Рігіштрассе, 2, 12277 Берлін, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування для лікування геморою та анальних тріщин.

Код АТС C05A X.

Препарат стимулює процеси місцевого імунітету за рахунок антигенної дії, спричиняючи як неспецифічну, так і специфічну імунні реакції.

Прискорює та покращує загоювання ран, має протизапальний ефект, попереджає реінфекцію та суперінфекцію.

Показання для застосування.

Місцеве лікування симптомів геморою.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У випадку грибкових інфекцій необхідно одночасно застосовувати місцево протигрибковий лікарський засіб.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Для застосування препарату у період вагітності або годування груддю протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Дані відсутні.

Діти. Не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням необхідно здійснити гігієнічні процедури анальної ділянки.

Застосовується ректально, дорослим по 1 супозиторію 2 рази на день (зранку та ввечері), по можливості після дефекації.

Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай термін застосування становить 5-7 днів.

Передозування.

Про випадки передозування або інтоксикації не повідомлялося. У разі випадкового перорального введення супозиторіїв (наприклад, дітьми) можливі розлади шлунково-кишкового тракту (біль у животі, нудота).

Побічні ефекти.

В окремих випадках у хворих із підвищеною чутливістю до компонентів супозиторіїв Постеризан може спостерігатися алергічна реакція шкіри.

Фенол, який використовується як консервант, може викликати місцеве подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.

Упаковка. 5 супозиторіїв пакуються в стрипи з алюмінієвої фольги, покритої поліетиленом. 2 стрипи з інструкцією для медичного застосування в картонній паці.

Категорія відпуску. Без рецепта.