

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

САЛЦИЛОВО-ЦИНКОВА ПАСТА

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: кислота саліцилова, цинку оксид ;

100 г пасти містять саліцилової кислоти - 2 г, цинку оксиду - 25 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Паста.

Однорідна паста білого або білого з ледь помітним жовтуватим відтінком кольору.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Препарати із пом'якшувальною та захисною дією. Препарати саліцилової кислоти. Код АТCD02A F.

Комбінований препарат для зовнішнього застосування. Низька концентрація саліцилової кислоти, що міститься у ньому (2%), виявляє протизапальну, протимікробну та кератопластичну дію. Пригнічує секрецію сальних і потових залоз. Цинку оксид виявляє слабку протимікробну, в'язучу, адсорбуючу дію, підсушує шкіру, що призводить до зменшення ексудації та сприяє зменшенню місцевих проявів запалення і подразнення. При зовнішньому застосуванні цинково-саліцилова паста практично не адсорбується в системний кровотік та не проявляє резорбтивної дії.

Показання для застосування. Шкірні захворювання: дерматити, попрілості, піодермія, рожеві вугри, вугровий висип, екзема, виразки з перевагою ексудації.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не рекомендується застосовувати при гострих гнійних процесах. Не наносити на слизові оболонки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалась.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами не описаний.

Діти. Препарат не застосовують для лікування дітей.

Спосіб застосування та дози. Дорослим пасту наносять на уражену поверхню тонким шаром 2-3 рази на добу. Тривалість курсу від 6 до 20 діб.

Передозування. Посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі місцеві реакції (у тому числі свербіж, висипання, печіння, сухість, лущення шкіри, кропив'янка, гіперемія). Алергічні реакції на компоненти пасти.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище +25°C ; не допускається заморожування.

Упаковка. Контейнери по 25 г .

Категорія відпуску. Без рецепта.