

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

МЕТІОНІН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: methionine;

1 таблетка містить DL-метіоніну 250 мг;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат полісорбат;

оболонка: цукор, магнію карбонат легкий, повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, титану діоксид (Е 171), барвник Понсо 4R (Е 124), віск жовтий, олія мінеральна легка.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті оболонкою, рожевого кольору. На поперечному розрізі видно два шари. На поверхні таблеток допускаються вкраплення.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Київський вітамінний завод».

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

Фармакотерапевтична група. Антидоти. Код АТХ V03A B26.

Метіонін – незамінна амінокислота, що бере участь у процесах переметилування. Виявляє ліпотропну дію, сприяє синтезу холіну, фосфоліпідів; бере участь у синтезі адреналіну, креатину; активує дію гормонів, вітамінів, ферментів. Має детоксикуючі властивості завдяки здатності метилювати токсичні продукти. Знижує концентрацію холестерину в крові і збільшує вміст фосфоліпідів.

Легко всмоктується з кишечника. Як незамінна амінокислота, що містить сірку, використовується для синтезу білків і вступає у різні метаболічні реакції – переметилування дезамінування, декарбоксилювання. Із сечею виділяється у невеликій кількості.

Показання для застосування.

Лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш'яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами.

В основі комбінованої терапії при хронічному алкоголізмі, цукровому діабеті, для лікування дистрофії, що розвивається при білковій недостатності після дизентерії та інфекційних захворювань, атеросклерозу, при тяжких хірургічних операціях, опіках.

Протипоказання.

Гострі вірусні гепатити, печінкова енцефалопатія, тяжка печінкова недостатність, підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При гострій і хронічній нирковій недостатності слід бути обережними у зв'язку з небезпесою виникнення гіперазотемії. Незбалансоване застосування метіоніну у великих дозах може призвести до пошкодження клітин печінки.

Через неприємний запах дітям приймати препарат із солодким сиропом, киселем.

Препарат містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю застосування препарату можливе тільки у випадку, коли користь від застосування для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Дані відсутні.

Діти. Дану лікарську форму не застосовують дітям до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим призначають по 500-1500 мг 3-4 рази на добу.

Дітям разові дози: у віці 3-6 років – 250 мг, 7 років і старше – 500 мг. Кратність прийому – 3-4 рази на добу.

Препарат слід застосовувати за 30 хвилин -1 годину до їди. Курс лікування – 10-30 днів або по 10 днів з 10-денними перервами між цими курсами.

Передозування.

Симптоми: можливі артеріальна гіпотензія, тахікардія, дезорієнтація.

Лікування: промивання шлунка, призначення активованого вугілля, симптоматична терапія.

Побічні ефекти. В окремих випадках – нудота, блювання, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Застосування Метіоніну у збалансованому співвідношенні з іншими амінокислотами запобігає його токсичній дії.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістерах.

По 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.