

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**МАКМІРОП КОМПЛЕКС®  
(MACMIROR COMPLEX®)**

**Склад:**

діючі речовини: ніфуратель, ністатин;  
100 г крему містять: ніфурателю 10 г, ністатину 4 000 000 МО;  
допоміжні речовини: ксаліфін 15; метилпарагідроксібензоат (Е 218); пропілпарагідроксібензоат (Е 216); гліцерин; сорбіту розчин, що не кристалізується (Е 420); пропіленгліколь; карбомер; триетаноламін; вода очищена.

**Лікарська форма.** Вагінальний крем.

Основні фізико-хімічні властивості: рідкий однорідний крем жовтого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Протимікробні та антисептичні засоби.

Код ATX G01AX.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

У лікарському препараті МАКМІРОП КОМПЛЕКС® поєднано діючі речовини ніфуратель і ністатин. Ніфуратель – це хімічна лікарська речовина, що синтезована науково-дослідною лабораторією POLI, здатна ефективно знищувати трихомонади, бактерії і грибкові мікроорганізми.

Ністатин – це відомий антибіотик протигрибкової дії, ефективний при лікуванні кандидомікозу.

Поєднання діючих речовин ніфурателю та ністатину зумовлює високу протигрибкову ефективність, знищує трихомонади і бактерії, при цьому взаємодія двох активних речовин не має негативних наслідків.

Більш того, дві лікарські речовини доповнюють і посилюють протигрибкову дію одна одна.

**Фармакокінетика.**

При застосуванні препарату його складові речовини препарату не всмоктуються і не зумовлюють системної дії.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Комплексна терапія вульвовагінальних інфекцій, спричинених чутливими до препарату збудниками: бактеріями, трихомонадами, грибками роду Candida.

**Протипоказання.**

Відома індивідуальна підвищена чутливість до діючих речовин препарату або до інших компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.**

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.

При одночасному застосуванні з латексними контрацептивами підвищує ризик їх пошкодження.

**Особливості застосування.**

Застосування препарату, особливо протягом тривалого часу, може спричинити реакції підвищеної чутливості.

Якщо виникають ознаки алергічної реакції, слід припинити застосування препарату.

Під час застосування препарату потрібно утримуватися від статевих стосунків.

Необхідно провести одночасне лікування статевого партнера, щоб уникнути повторного зараження.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Не слід застосовувати препарат у період вагітності.

Під час лікування слід припинити годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовувати по 2,5 г вагінального крему 1 або 2 рази на добу, увечері та/або вранці.

Необхідну дозу вагінального крему вводити за допомогою шприца-дозатора.

**Порядок використання шприца-дозатора**

Нагвинтити шприц дозатор на тубик вагінального крему, натиснути на тубик, щоб до дозатора увійшла потрібна кількість крему (див. на відмітки, якими позначено кількість у грамах).

Відгвинтити шприц від тубика, увести шприц до вагіни, натискаючи на поршень шприца.

У разі необхідності можна від'єднати наконечник від поршня і нагвинтити наконечник на інший бік шприца перед тим, як вvesti його до вагіни.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, зазвичай курс лікування становить – 8 днів.

**Діти.** Препарат не застосовувати дітям.

**Передозування.**

Немає підіймів ризиків передозування.

**Побічні реакції.**

З боку шкіри та підшкірної клітковини:

дуже рідко: алергічні реакції, включаючи висип, свербіж, контактний дерматит, крапив'янку.

Загальні розлади та у місці введення:

дуже рідко: вагінальний свербіж, печіння.

З боку імунної системи:

частота невідома: реакції гіперчутливості.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** 30 г вагінального крему в алюмінієвій тубі в комплекті з аплікатором (градуйованим шприцом), вміщені в картонну пачку.

**Категорія відпуску.** За рецептром.

**Виробник.** Доппель Фармацеутіц С.р.л.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Віа Мартірі делле Фоібе, 1 – 29016 Кортемагніє (PC) - Італія.