

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ПРОЖЕСТІН-KP®**  
**(PROGESTINUM-KR)**

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 г гелю містить прогестерону (у перерахуванні на суху речовину) – 10 мг;

*допоміжні речовини:* поліетиленоксид, гліцерин, етанол 96 %, карбом ер, триетаноламін, олія рицинова поліетоксильована, гідрогенізована, вода очищена.

**Лікарська форма.** Гель.

**Фармакотерапевтична група.**

Гормони статевих залоз та препарати, які застосовуються при патології статевої сфери.

Прогестерон.

Код АТС G03D A04.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Мастодинії і доброякісні мастопатії на тлі прогестеронової недостатності.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо. Одну дозу аплікатора (2,5 г гелю) 1 раз на добу наносять на поверхню кожної молочної залози і втирають до повного всмоктування.

Тривалість курсу лікування – не менше 3 місяців.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції.

**Передозування.**

У зв'язку з низькою абсорбцією передозування малоімовірно.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У II-III триместрах вагітності або у період годування груддю препарат можна застосовувати лише у тому разі, коли очікувана користь від застосування препарату для матері перевищує можливий ризик для плода.

**Діти.**

Досвіду застосування препарату дітям віком до 16 років немає.

**Особливості застосування.**

Не перевищувати рекомендовану дозу.

Нанесення гелю здійснюється після миття, на суху шкіру. Застосовується незалежно від днів менструального циклу. Після нанесення слід уникати прямих сонячних променей.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

У період лікування слід бути обережним при керуванні автотранспортом або роботі з іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При даному способі застосуванні клінічно значущих взаємодій не встановлено.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Прогестерон є гормоном жовтого тіла. у тканинах молочної залози прогестерон знижує проникність капілярів та інтенсивність циклічного набряку сполучнотканинної стромы, запобігає проліферації та мітотичній активності епітелію протоків.

*Фармакокінетика.* При нанесенні на шкіру всмоктується близько 10 % від застосованої дози. У системний кровотік не потрапляє, метаболізується в шкірі і тканинах молочної залози. Системна дія відсутня або незначна.

**Фармацевтичні властивості.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** гель безбарвний зі злегка жовтуватим відтінком, зі специфічним запахом.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка.**

По 40 г гелю в тубі в комплекті зі шпателем-дозатором.

**Категорія відпуску.**

За рецептом.

**Виробник.**

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

**Місцезнаходження.**

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.