

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ОЦИЛОКОКЦІНУМ®
(OSCILLOCOCCINUM®)

Склад:

діюча речовина:

1 г гранул містить *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum* 200К - 0,01 мл;

допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат.

Лікарська форма.

Основні фізико-хімічні властивості: білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічні властивості препарату зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання. Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит Lарр-лактази або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлено.

Особливості застосування.

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки безпека застосування Оцилококцінуму® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не виявлено.

Спосіб застосування та дози.

Для перорального застосування.

Дорослі та діти

- *Профілактика захворювання:* у період епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань приймати по 1 дозі (1 г гранул, вміст 1 пенала) 1 раз на тиждень.

- *Початкова стадія захворювання:* прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 або 3 рази з інтервалом у 6 годин.

- *Виражена стадія захворювання:* приймати по 1 дозі 2 рази на добу (переважно вранці та ввечері) протягом 1-3 днів.

Вміст 1 пенала (1 г гранул) слід тримати під язиком у роті до повного розчинення.

Якщо протягом 3 днів від початку лікування стан не покращився або погіршився, необхідно звернутися до лікаря.

Діти. Дітям віком від 2 до 6 років перед прийомом гранули рекомендується розчинити у невеликій кількості воді.

Діти. Оцилококцінум® можна застосовувати дітям віком від 2 років.

Передозування. Про випадки передозування препарату не повідомлялося.

Побічні реакції. В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання, свербіж.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

Упаковка. Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. БУАРОНВОIRON

Місцезнаходження виробника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2

Мессімі 69510 Франція

2, avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY France

Вул. Ліберасьон, 20

Сент-Фуа-ле-Ліон 69110 Франція

20, rue de la Libération,

69110 SAINTE FOY-LES-LYONFrance

Заявник. БУАРОНВОIRON

Місцезнаходження заявника.

Авеню де л'Уест Ліоне, 2 - MECCIMI 69510 Франція

2, avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 MESSIMY France