

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ШАВЛІЇ ЛИСТЯ**  
**(SALVIAE OFFICINALIS FOLIUM)**

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: шавлії листя;

**Лікарська форма.** Листя.

Подрібнена сировина: шматочки листків різноманітної форми з невеликою кількістю інших частин рослини (шматочки стебел, квіток з квітконіжками та без них). Колір зелений, сірувато-зелений або сріблясто-білий, з синьо-фіолетовими краплями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, злегка в'язучий.

Порошок крупний: шматочки листків різноманітної форми з невеликою кількістю інших частин рослини (шматочки стебел, квіток з квітконіжками та без них), подрібнені до розміру 3-5 мм. Колір зелений, сірувато-зелений або сріблясто-білий, з синьо-фіолетовими краплями. Запах приємний. Смак гіркувато-пряний, злегка в'язучий.

**Назва і місце знаходження виробника.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для застосування у стоматології.  
Код АТС А01А D11.

Біологічно активні речовини листя ущільнюють епітеліальні тканини, знижують проникність клітинних мембран, зміцнюють стінки uszkodжених кровоносних судин. Чинять в'язучу, протизапальну, антисептичну та кровоспинну дію.

**Показання для застосування.** Захворювання ротової порожнини (стоматити, гінгівіти, пародонтози) та верхніх дихальних шляхів (ларингіти, фарингіти, трахеїти).

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** За призначенням лікаря у випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат застосовують дітям віком старше 3 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.  
Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскань 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком старше 12 років – у нерозведеному вигляді, дітям віком 7-12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3-7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.  
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскань 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком старше 12 років – у нерозведеному вигляді, дітям віком 7-12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3-7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.  
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** При передозуванні можливе посилення побічних реакцій.

**Побічні ефекти.** Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 1 рік 6 місяців.  
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготуваний настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

**Упаковка.** По 40 г або по 50 г, або по 60 г упаци з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.