

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА
(EUCALYPTI TINCTURA)

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 1 флакон містить настойки евкаліпта прутовидного листя (*Eucalypti viminalis folia*) (1:5)
екстрагент – етанол 70 %) 25 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при беріганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група. Засоби для застосування в стоматології.

Код АТС А01АD11.

Евкаліпта настойка комплекс біологічно активних речовин: дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки (у тому числі цинеолмоноциклічний терпен), які згубно впливають на грампозитивні, грамнегативні мікроорганізми, гриби та найпростіші. Препарат пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби, чинить антисептичну, протизапальну, дезінфікуючу, помірну седативну (заспокійливу) дію.

Показання для застосування.

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки тяжкого перебігу.

Далєжні заходи безпеки при застосуванні. Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується вживати внутрішньо жінкам у період вагітності чи годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Евкаліпта настойку при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 12 років за призначенням та під наглядом лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Евкаліпта настойку приймають внутрішньо, а також для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15-30 крапель настойки 3-4 рази на день після їди; дітям віком від 12 років - з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на день після їди.

Для полоскання розвести 10-15 крапель настойки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи препарат у перозведеному стані або після попереднього розведення його водою (як для полоскання).

Ефективність лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту, що визначається лікарем.

Передозування.

Не встановлено.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (в ділянці губ); нудота, блювання і діарея. При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах або по 25 мл у флаконі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА (EUCALYPTI TINCTURA)

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 1 флакон містить настойки евкаліпта прутовидного листя (*Eucalypti viminalis folia*) (1:5)
Екстрагент – етанол 70 %) 25 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина зеленувато-бурого кольору зі специфічним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,

вул. Корольова, б. 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби для застосування в стоматології.

Код АТС А01AD11.

Евкаліпта настойка комплекс біологічно активних речовин: дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки (у тому числі цинеолмоноциклічний терпен), які згубно впливають на грампозитивні, грамнегативні мікроорганізми, гриби та найпростіші.

Препарат пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад,

изентерійної амеби, чинить антисептичну, протизапальну, дезінфікуючу, помірну седативну (заспокійливу) дію.

Показання для застосування.

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки тяжкого перебігу.

Небезпечні заходи безпеки при застосуванні. Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується вживати внутрішньо жінкам у період вагітності чи годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Оскільки у складі препарату міститься етанол, не рекомендується застосовувати Евкалипта настоянку при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 12 років за призначенням та під наглядом лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Евкалипта настоянку приймають внутрішньо, а також для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15-30 крапель настоянки 3-4 рази на день після їди; дітям віком від 12 років - з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на день після їди.

Для полоскання розвести 10-15 крапель настоянки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи препарат у перозведеному стані або після попереднього розведення його водою (як для полоскання).

Тривалість лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту, що визначається лікарем.

Передозування.

Не встановлено.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у т.ч. кропив'янка, почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (в ділянці губ); нудота, блювання і діарея. При виражених реакціях застосування препарату необхідно припинити.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах або по 25 мл у флаконі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.