

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА
(CRATAEGI TINCTURA)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл препарату містить настойку глоду плодів (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %).

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від жовто-червоного до червонувато-бурого кольору, іркувата на смак, із слабким ароматним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються у кардіології.

Код АТСС01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у глоду плодах (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, три терпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв-1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії); як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат може спричинити сонливість, тому під час застосування слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується застосовувати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років – із розрахунку одна крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

Лікування: припинення застосування препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію серцевих глікозидів та анти аритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних і гіпотензивних засобів.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл або 50 мл або 100 мл у флаконі;

По 25 мл або 50 мл або 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА (CRATAEGI TINCTURA)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл препарату містить настойку глоду плодів (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %).

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від жовто-червоного до червонувато-бурого кольору, іркувата на смак, із слабким ароматним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,
4.

вул. Корольова, б.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються у кардіології.

Код АТСС01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у глоду плодах (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, три терпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через

30 хв-1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії); як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат може спричинити сонливість, тому під час застосування слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується застосовувати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років – із розрахунку одна крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

Лікування: припинення застосування препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію серцевих глікозидів та анти аритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних і гіпотензивних засобів.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл або 50 мл або 100 мл у флаконі;

По 25 мл або 50 мл або 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.