

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЛЬОНУ НАСІННЯ**

**(SEMINA LINI)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* льону насіння.

**Лікарська форма.** Насіння.

Насіння сплюснуте, яйцевидної форми, загострене з одного боку та закруглене з іншого, нерівнобоке, довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насіння гладка, блискуча, зі світло-жовтим, виразно помітним насінним рубчиком (лупа 10 х).

Колір насіння від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизисто-маслянистий.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Код АТСА02 Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

**Показання для застосування.** У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).

**Протипоказання.** Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.** Перед застосуванням слиз необхідно збовтувати.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Застосовувати лише за призначенням лікаря у випадку, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.** 1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, проїїдити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/4 склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** При передозуванні можлива діарея.

**Побічні ефекти.** Можливі алергічні реакції. При тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 г або 200 г у пакети з вкладанням у пачку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.