

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАРДІОЛІН
(CARDIOLIN)

Склад лікарського засобу: 1 мл крапель містить:

діючі речовини: настойку з лікарської рослинної сировини (1:12,5) трави горицвіту весняного (Herba adonidis vernalis), плодів ялівцю звичайного (Fructus juniperi communis), арніки квіток (Arnicae flos), м'яти листя (Menthae piperitae folium) (екстрагент – етанол 40 %);

допоміжна речовина: відсутні;

1 мл препарату містить 0,35 мл етанолу.

Лікарська форма. Краплі для перорального застосування.
Прозора рідина світло-коричневого кольору з приємним запахом.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ «Біолік»,
24321, Вінницька обл., м. Ладизин, вул. Леніна, 118.

Назва і місце знаходження заявника.

ТОВ «Українська фармацевтична компанія»,
02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ C01E X.

При функціональних серцевих розладах препарат чинить кардіопротекторну та антиоксидантну дію.

Кардіолін – комбінований препарат, що містить витяжку з лікарських рослин: трава горицвіту весняного, яка чинить легку діуретичну, седативну дію і має протиаритмічні властивості; плоди ялівцю звичайного мають діуретичний вплив; арніки квітки мають кардіопротекторну активність; м'яти листя – помірну спазмолітичну, седативну, жовчоїдну активність.

Препарат позитивно впливає на обмін речовин у міокарді, печінці, зокрема пригнічує процеси перекисного окиснення ліпідів, підвищує активність антиоксидантних ферментів, енергетичний баланс клітин, стимулює синтез аденінових нуклеотидів, глікогеноліз, підвищує активність ряду ферментів циклу Кребса.

Препарат чинить легку седативну дію, зменшує прояви діенцефальних порушень, покращує переносимість фізичних навантажень, сприяє підвищенню працездатності.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні нейроциркуляторної дистонії, неврозів серця, ішемічної хвороби серця (стенокардія напруження I-II ФК).

Протипоказання.

Депресія, алкоголізм в анамнезі, одночасне застосування препаратів, що містять спирт, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, цироз печінки, прийом нейролептиків і транквілізаторів, підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена брадикардія, атріовентрикулярна блокада, глікозидна інтоксикація, WPW-синдром, тяжкі захворювання нирок.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Під час лікування препаратом слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.

Хворим з гастроєзофагеальним рефлюксом не слід вживати препарат, тому що може посилитись печія.

Хворим із жовчокам'яною хворобою та іншими хворобами жовчовивідних шляхів застосовувати препарат слід з обережністю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У період застосування препарату забороняється керувати автомобілем та працювати з потенційно небезпечними механізмами.

Діти. Досвіду застосування дітям немає.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим внутрішньо по 20-30 крапель 2-3 рази на добу, за 30 хвилин до або через 1 годину після їди. Препарат можна розводити водою у співвідношенні 1:3 або 1:5.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально і в середньому становить 20-30 днів.

Передозування.

При значному підвищенні дози можлива сонливість, диспептичні розлади, алергічні реакції, що потребують припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Кардіолін може викликати прояви гіперчутливості, диспептичні розлади, нудоту, блювання, біль у животі, запор, діарею, сонливість, посилення діурезу, пітливість, озноб.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Небажане сумісне застосування з серцевими глікозидами, тому що препарат містить траву горицвіту і можливі прояви токсичності.

Оскільки препарат Кардіолін містить спирт етиловий 40 % і траву горицвіту, можливе потенціювання дії снодійних препаратів, транквілізаторів, седативних засобів, нейролептиків, а також препарат може посилювати кардіотонічний ефект і токсичність серцевих глікозидів.

При одночасному застосуванні з протиаритмічними засобами класу ІА (хінідин, прокаїнамід, дизопірамід), препаратами кальцію, проносними засобами та глюкокортикостероїдами посилюється їхній ефект та токсична дія.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час зберігання можливе випадання осаду.

Упаковка. По 30 мл або 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.