

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МЕНОВАЗИН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: ментол рацемічний, прокаїну гідрохлорид, бензокаїн;
1 мл розчину містить ментолу рацемічного 25 мг, прокаїну гідрохлориду 10 мг, бензокаїну 10 мг;
допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.
Прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.

Назва і місце знаходження виробника.

Дочірнє підприємство „Агрофірма ”Ян” приватного підприємства „Ян”.
Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Немиринці, вул. Дзержинського, 58.

Фармакотерапевтична група.

Протисвербіжні засоби. Код АТС D04A X.
Препарат має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.
Чинить легку знеболювальну дію.
При місцевому застосуванні препарат не надходить до кров'яного руслу.

Показання для застосування.

Препарат призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до прокаїну гідрохлориду та інших складових компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.

Діти.

Досвід застосування препарату у дітей відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирають Меновазином 2-3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або в комплексі з іншими лікарськими засобами).

Передозування.

Можуть виникнути запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів необхідно змити залишки препарату з поверхні шкіри водою. У цих випадках препарат відміняють, проводять симптоматичне лікування.

Побічні ефекти.

Можливі шкірні алергічні реакції (гіперемія, відчуття свербіж, кропив'янка, набряк), запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Компоненти препарату (прокаїну гідрохлорид, бензокаїн) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів. Посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря!

Термін придатності.

2 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С .
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Флакони по 40 мл.

Категорія відпуску.

Без рецепта.