

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАРИМЕР
(MARIMER)

Склад лікарського засобу:

100 мл розчину містять стерильний розчин морської води 31,82 мл;

допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Прозорий, безбарвний розчин.

Назва і місцезнаходження виробника.

Лабораторії ЖІЛЬБЕР, Франція.

928, Авеню Генерала де Голя, 14200 Ерувіль Сент-Клер, Франція.

Laboratoires Gilbert, France

928, Avenue du General de Caulle, 14200 Herouville Saint -Clair, France.

Фармакотерапевтична група.

Засіб, який застосовують при захворюваннях порожнини носа.

Код АТС R01A X10.

Сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки носа.

Сприяє розрідженню слизу і полегшує його видалення з носової порожнини.

Мікроелементи, що входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки носа до патогенних бактерій і вірусів.

При алергічних ринітах сприяє видаленню алергенів зі слизової носа, зменшенню місцевого запального процесу.

Мікродифузна система розпилення препарату забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що сприяє ефективному впливу мікроелементів.

Показання для застосування.

- Як додатковий засіб при інфекційних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки.
- Як засіб, що сприяє видаленню назального секрету при утрудненому носовому диханні.
- Для щоденної гігієни порожнини носа.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Дозуючий пристрій слід промивати після кожного впорскування.

Не розпиляти під прямими сонячними променями та при високій температурі.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Дозволено застосування в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат не застосовують дітям до 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Інтраназально.

Рекомендована доза з лікувальною метою становить по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 4-6 разів на добу, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу, залежно від необхідності. Курс лікування становить 2-4 тижні. За необхідності курс лікування повторюють.

Нахилити голову вбік, промити верхній носовий хід. Повторити процедуру з іншим носовим ходом. Залишок рідини, що витікає, усувають.

Передозування. Випадків передозування не відмічено.

Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відмічена. Можна застосовувати з іншими лікарськими засобами у складі комбінованої терапії.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 мл або по 100 мл у флаконі. По 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.