

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УГРИН®
(UGRINUM)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містять настойки (1:10) з суміші лікарської рослинної сировини «Угрин®»: millefolii herba (деревію трава) 1,5 г; menthae folia (м'ята листя) 1,5 г; calendulae officinalis flores (нагідок квітки) 1,5 г; tanacetii flores (пижми квітки) 1,5 г; lavandulae herba (лаванди трава) 1 г; chelidoni herba (чистотілу трава) 1 г; chamomillae recutitae flores (ромашки квітки) 2 г; (екстрагент : етанол 40 %).

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина червоно-бурого кольору, з духмяним специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група. Інші дерматологічні препарати.

Код АТСD11А Х.

Лікувально-гігієнічний засіб для догляду за шкірою обличчя. Угрин® чинить виражену ранозагоювальну, протизапальну та антимікробну дію за рахунок компонентів, що входять до його складу. Не спричиняє вищезгаданого запалення, гіперемії, подразнення шкіри, в той же час зберігає її гідрофільність.

Показання для застосування.

Вугровий висип і жирна себорея обличчя легкої і середньої тяжкості (лікування та профілактика), піодермія, дерматити.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Бронхіальна астма.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Для запобігання виникненню побічних ефектів при застосуванні слід дотримуватися рекомендацій, викладених у розділі «Спосіб застосування та дози».

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки на даний час немає достатніх даних щодо безпеки його застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років, оскільки до складу препарату входить етанол 40 %.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати зовнішньо. При вугровому висипі і жирній себорей обличчя уражені ділянки шкіри протирати ватним тампоном, змоченим препаратом, 3-5 разів на добу, не змиваючи не витираючи протягом 1,5-2 годин. Хворим рекомендується не видавлювати вугрі. Курс лікування – 3-15 днів. Через 10-15 днів курс лікування можна повторити. Під час лікування шкіру обличчя вранці та ввечері потрібно мити теплою водою і дитячим милом, обов'язково ополіскуючи холодною водою.

При дерматитах і піодермії препарат наносити на уражені ділянки шкіри рівним шаром, 3-5 разів на добу. Курс лікування – 1 місяць. У разі необхідності курс лікування можна повторити.

Як профілактичний засіб Угрин® застосовувати таким чином: ватним тампоном, змоченим препаратом, протирати жирну та нормальну шкіру обличчя 1-3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення алергічних реакцій, у тому числі гіперемія, свербіж шкіри, висипання, кропив'янка, контактний дерматит, набряк Квінке, анафілактичний шок.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію протизапальних, репаративних та антимікробних засобів. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконі або банці. По 1 флакону або банці у пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.