

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХОЛЕ-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Chelidonium 200CH 20 мг, Lycopodium 200CH 20 мг, Berberis 200CH 20 мг, Carduus marianus 50CH 20 мг, Taraxacum 50CH 20 мг;

допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Послаблює біль, спазми жовчовивідних шляхів, диспептичні розлади. Сприяє утворенню та відтоку жовчі, поліпшує перистальтику кишечника. Сприяє регенерації печінкових клітин після гострих гепатитів (інфекційний гепатит В, інтоксикаційні гепатити).

Показання для застосування.

У складі комплексного лікування: гострі та хронічні захворювання печінки та жовчовивідних шляхів. Хронічні холециститу, гепатити, дискінезії жовчовивідних шляхів. Жовчнокам'яна хвороба. Запори. Як гепатопротектор при променевої та хіміотерапії. Неспецифічна профілактика вірусного гепатиту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При одночасному застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності і годування груддю не досліджувалось.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям від 7 років – по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 1 до 7 років – із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом), розчинені в невеликій кількості води або під язик.

Гранули слід приймати за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди.

Приймати 1–2 рази на добу протягом 2–3 місяців.

За необхідності курс лікування повторити через 2–3 тижні.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе застосування сумісно з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.