

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПРОСТАМЕД
(PROSTAMED®)

Склад лікарського засобу:

дючі речовини: 1 таблетка містить борошна насіння гарбуза *Cucurbitae semen*)

200 мг, гарбузового глобуліну (*cucurbitae globulin*) 100 мг, екстракту золотушника (*Solidago extractum*) (5:8:1) сухого, екстрагент: етанол 60 об. % 2,6 мг, екстракту листя осики (*Populus tremula folia extractum*) (5:8:1) сухого, екстрагент: етанол 60 об. % 6,3 мг;

допоміжні речовини: какао порошок, лактози моногідрат, сахароза, кальцію гідрофосфат, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, желатин, гліцерин, натрію хлорид, повідом.

Лікарська форма. Таблетки.

Коричневі, круглі таблетки з опуклою поверхнею.

Назва і місцезнаходження виробника.

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при доброкісній гіпертрофії передміхурової залози. Код ATC G04C X.

У препараті міститься глобулін, одержаний з насіння *Cucurbita pepo*.

З 15 амінокислот, виділених з цього глобуліну та ідентифікованих на сьогодні, особливе значення має глутамінова кислота. Глутамінова кислота катализує окислювальне дезамінування амінокислот та знижує патологічно підвищений рівень вільних амінокислот у тканині гіпертрофованої передміхурової залози.

У результаті зменшується кількість амінокислот, які можна використовувати для біосинтезу білків, і уповільнюється проліферація тканини передміхурової залози.

У насінні гарбуза міститься кукурбітин, фітостерини у вільній і зв'язаній формі, токофероли, а також мінеральні речовини, насамперед селен *Solidago* (золотушник) підвищує фільтраційну здатність нирок і тим самим протидіє утворенню залишкової сечі при adenomі передміхурової залози II стадії. Підвищення тонусу мускулатури сечового міхура призводить до зменшення симптомів розладів сечовиділення, особливо дизурії, і до зменшення кількості залишкової сечі. *Solidago* має противапальну, спазмолітичну та сечогінну дії. *Populus tremula* (осика) містить багато фенольних глікозидів (саліцину, попупіну та саліпопупіну). Саліцин окислюється в організмі людини і перетворюється на саліцилову кислоту, яка чинить дезінфекційну дію при уретроціститі. Фенольні глікозиди, які мають болезносприймливу і противапальну дії, зменшують біль у передміхурової залозі і чутливість сечового міхура.

Показання для застосування.

Розлади сечовиділення при доброкісній гіперплазії (аденомі) передміхурової залози I-II стадій утруднене сечовипускання, часте сечовипускання, у тому числі у нічний час, відчуває неповного випорожнення сечового міхура (наявність залишкової сечі), непереборні позиви до сечовипускання.

Гострий та хронічний простатит (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препаратору, саліцилатів, рослин родини складноцвітних.

Захворювання, при яких необхідно обмежити споживання рідини, наприклад тяжкі захворювання серця, тяжкі захворювання нирок.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить лактозу та сахарозу. Пацієнтам із рідкінними спадковими формами непереносимості галактози або сахарози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції, недостатністю сахарази-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Якщо в зв'язку з основним захворюванням такі симптоми, як підвищення температури, дизуричні явища, спазми зберігаються, або з'являється гематурія та/або гостра затримка сечі, необхідна консультація лікаря.

Не можна зберігати в холодильнику.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовують для лікування чоловіків.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат не призначений для лікування дітей.

Способ застосування та дози.

Дорослим застосовувати по 2-4 таблетки 3 рази на день. Таблетки слід подрібнити і проковтнути, запиваючи невеликою кількістю рідини.

Тривалість застосування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

Передозування.

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні ефекти.

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи алергічні реакції з боку шкіри; шлунково-кишкови розлади (у тому числі печія, нудота, біль у животі, діарея). Дзвін у вухах.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препаратору та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дотепер невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Зауваження. Побіління або поява нальоту на поверхні таблеток не свідчить про зниження якості препаратору. Це спричинено літідним окисленням, зумовленим наявністю какао у препараторі Простамед. Побіління і наліт зникають при легкому нагріванні таблеток і стосуються тільки зовнішнього вигляду препаратору.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 60 або 120 або 200 таблеток у тубі, по 1 тубі у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.