

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЛЕСПЕФРИЛ**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 мл розчину отримують із пагонів леспедези двоколірної 70,8г;  
*допоміжні речовини:* етанол, олія анісова, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин оральний

Розчин від світло-коричневого з оранжевим відтінком до червоно-коричневого кольору із специфічним запахом. Допускається наявність легкого осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «ВІФІТЕХ».  
Російська Федерація, 142279, Московська обл., Серпуховський р-н, с. Оболенськ.  
ПАТ «Лубнифарм».  
37500, Полтавська обл., місто Лубни, вул. Петровського, 16.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04B X.

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу препарату Леспефрил сприяє збільшенню ниркової фільтрації, зменшує азотемію, прискорює виведення азотистих шлаків із сечею, збільшує діурез, посилює виведення натрію і меншою мірою калію.

**Показання для застосування.**

Препарат застосовують дорослим як гіпоазотемічний і діуретичний засіб для симптоматичної терапії при хронічній нирковій недостатності.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.  
Через наявність у препараті етанолу його не можна призначати хворим, які застосовують препарати, що пригнічують центральну нервову систему, інсулін, цукрознижувальні засоби (метформін, сульфонаміди), лікарські засоби для лікування алкоголізму (наприклад дисульфідам).  
Вагітність, період годування груддю.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря.

**Особливі застереження.**

***Застосування у період вагітності або годування груддю***

Леспефрил протипоказаний у період вагітності або годування груддю.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Через наявність у препараті етанолу можливе зниження психомоторних реакцій, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

***Діти.***

Препарат не застосовують дітям.

***Спосіб застосування та дози.***

Леспефрил застосовують внутрішньо по 5-15 мл (1 чайна – 1 столова ложка) 3-4 рази на добу. Допускається розведення препарату водою перед застосуванням. Курс лікування – 3-4 тижні.  
Проведення повторного курсу лікування можливе через 2-3 тижні після консультації з лікарем.

**Передозування.**

Ознаки, що пов'язані з наявністю етанолу в препараті.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції. Рідко препарат може спричинити гіпонатріємію, яку можна компенсувати введенням препаратів натрію.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не досліджувалася.

**Термін придатності.** 2 роки 6 місяців.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 100 мл у флаконах або банках із оранжевого скла. Кожен флакон або банку вміщують у картонну коробку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.