

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ГЛОДУ ЛИСТЯ І КВІТКИ (CRATAEGI FOLIA ET FLORES)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: глоду листя і квітки.

Лікарська форма. Листя і квітки.

Подрібнена сировина: суміш неподрібнених квіток, бутонів, окремих пелюсток, тичинок та їх шматочків, шматочків квітконіжок, листя, черешків з домішками шматочків гілочок різної форми зеленуватого, червоно-коричневого, коричневато-червоного або буровато-червоного, коричневого чи сіро-коричневого, від ярко-зеленого до темно-зеленого, сіро-зеленого, буровато-білого чи жовтувато-білого кольору;
порошок крупний: суміш шматочків листя, квіток, бутонів, пелюсток, квітконіжок, тичинок, черешків, гілочок різної форми зеленуватого, червоно-коричневого, коричневато-червоного чи буровато-червоного, коричневого або сіро-коричневого, від ярко-зеленого до темно-зеленого, сіро-зеленого, буровато-білого чи жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Лікстрави»

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21

Фармакотерапевтична група. Кардіологічні препарати. Код АТХ C01E B04.

Біологічно активні речовини препарату чинять кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну і заспокійливу дію; покращують роботу серцевого м'яза, усувають порушення ритму серцевих скорочень, посилюють кровообіг у коронарних судинах серця та судинах головного мозку, нормалізують артеріальний тиск, знижують проникність стінок кровоносних судин і капілярів, сприяють зниженню рівня холестерину в крові.

Показання для застосування.

Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози, легкі форми аритмій, початкові стадії артеріальної гіпертензії – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Виражені артеріальна гіпотензія і брадикардія; гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

На період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, оскільки можливе виникнення сонливості.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 14 років.

Спосіб застосування та дози.

У пачках: 1 столову ложку листя і квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 1/3 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди, дітям старше 14 років – по 1/4 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди.

Перед застосуванням настій збовтати.

По 2,5 г у фільтр-пакетах: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 1/3 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди, дітям старше 14 років – по 1/4 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди.

По 1,5 г у фільтр-пакетах: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 1/2 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди, дітям старше 14 років – по 1/3 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

При передозуванні виникають сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень, зниження артеріального тиску. При виникненні даних симптомів слід припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При тривалому застосуванні може з'явитися сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Посилює дію снодійних, седативних та антиаритмічних засобів, серцевих глікозидів.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15°C не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г або 60 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г або 2,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або в пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.