

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПОЛИНУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки трави і листя полину гіркого (1:5) (*Absinthii herba et folia*) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Рідина бурувато-зеленого кольору з характерним запахом. В процесі зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група. Засіб рослинного походження що підвищує апетит. Гіркота (amara).

Код АТС А 15.

Подразнює чутливі нервові закінчення смакових рецепторів слизових оболонок порожнини рота, язика, що рефлексорним шляхом викликає підсилення секреції шлункового соку, підвищення апетиту, покращення процесу травлення.

Показання для застосування.

Гіпоацидний і анацидний гастрит, анорексія у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Підвищена шлункова секреція, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба, рефлекс-езофагіт, епілепсія. Вагітність. Діти до 12 років. Наявність в анамнезі кровотеч із органів малого тазу, анемія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

У період застосування препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Дітям віком від 12 років препарат застосовують за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Приймають внутрішньо по 15-20 крапель 3 рази на добу за 15-30 хв до прийому їжі. Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості захворювання, характеру супроводжуючої терапії, досягнутого ефекту.

Передозування.

Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій, втрати свідомості.

При тривалому застосуванні можливі атонічні запори.

Лікування: симптоматичне.

Побічні ефекти.

Тривале застосування настойки полину може викликати так звану полинну епілепсію, прийом в підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та ін.

Нудота, блювання, можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж).

Абсинтин, що міститься у полині, при тривалому вживанні може спричинити атонію кишок.

При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах-крапельницях (без пачок або у пачках).

Категорія відпуску. Без рецепта.