

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДЕПАНТОЛ-ЗДОРОВ'Я

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: декспантенол;

1 балон містить декспантенолу 2,5 г;

допоміжні речовини: Euxyl®PE 9010 (90% феноксіетанолу та 10% етилгексилгліцерину), DL-пантолактонспирт цетостеариловий, калію цетилфосфат, гліцерин, диметикон ДМ 100, вода очищена, хладон 134а.

Лікарська форма. Аерозоль нашкірний.

Препарат при виході з балона утворює піну білого кольору.

Назва і місце знаходження виробника.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування ран та виразкових уражень. Код ATC D03A X03.

Діючою речовиною препарату є декспантенол – провітамін В₅. У клітинах шкіри декспантенол швидко перетворюється в пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол швидше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після зовнішнього застосування.

Пантотенова кислота є компонентом коензиму А. У цій формі ацетилкоензим Авідіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини. Пантотенова кислота є, таким чином, необхідною для формування і загоснення пошкоджених шкіри і слизових оболонок.

Декспантенол при зовнішньому застосуванні швидко абсорбується шкірою. У клітинах шкіри декспантенол відразу перетворюється на пантотенову кислоту і потрапляє до сидогенного фонду цього вітаміну.

У крові пантотенова кислота з'являється з β-глобуліном та альбумінами плазми крові.

Пантотенова кислота не зазнає біотрансформації, вона видаляється незміненою (60 - 70 % виводиться із сечею, решта – з фекаліями).

Показання для застосування.

Різні ушкодження шкіри та слизових оболонок, у тому числі садна, опіки, асептичні післяопераційні рани, транспланати шкіри, бульозний та пухирчастий дерматит.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Особливі застереження.

Аерозольний балон знаходиться під тиском, тому необхідно запобігати падінням, ударам, впливу прямих сонячних променів і не слід нагрівати до температури понад 25 °C. Препарат не наносити на мокнучі рани. При лікуванні ран і опіків препарат застосовують на стадії регенерації.

Після закінчення застосування препаратору балон нерозкривати і не сплювати. Не розпилювати препарат поблизу відкритого вогню або на розжарені предмети. Не допускати потрапляння в очі. При випадковому потраплянні препаратору в очі їх необхідно ретельно промити водою.

Обмежень щодо застосування у дітей та людей літнього віку немає, але дітям слід застосовувати препарат лише під наглядом дорослих.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказань немає.

У період лактації препарат наносять на шкіру молочних залоз після годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Дані щодо впливу препаратору на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні.

Діти.

Препарат застосовують у педіатричній практиці після консультації з лікарем і лише під наглядом дорослих.

Способ застосування та дози.

При застосуванні тримати вертикально клапаном догори. Перед використанням балон слід добре струсити. При першому використанні балона можливе розпилення лише газу протягом кількох секунд, а потім з'являється піна.

Аерозоль застосовують один або декілька разів на добу шляхом рівномірного нанесення на відповідні ушкоджені ділянки. Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.

Не використовувати біля відкритого полум'я або дуже нагрітих предметів. Балон під тиском. Після використання балон не розбирати, не кидати у вогонь.

Передозування.

Немає даних щодо передозування препаратором.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можуть виникнути місцеві алергічні реакції, що потребують відміни препаратору.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

Пантенол може посилювати дію деполяризуючих міорелаксантів (суксаметоній, декаметоній) і зменшувати дію недеполяризуючих міорелаксантів (тубокуарин, галамін) у зв'язку з тим, що стимулює синтез ацетохоліну.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C. Не заморожувати.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Аерозоль нашкірний по 58,5 г у балонах разом з насадкою із захисним ковпачком у коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.