

# ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

## КОЛІКІД<sup>®</sup> (COLLICKID<sup>®</sup>)

### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 мл суспензії містить симетикон емульсії еквівалентно симетикону 40 мг;

*допоміжні речовини:* полісорбат 80, карбомер, сахарин натрію, гліцерин, натрію бензоат (Е 211), смакова добавка м'ята перцева, смакова добавка солодкий ананас, натрію гідроксид, вода очищена.

**Лікарська форма.** Суспензія оральна.

*Основні фізико-хімічні властивості:* суспензія білого кольору з характерним запахом.

### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Силікони.

Код АТХ А03А Х13.

### **Фармакологічні властивості.**

#### *Фармакодинаміка.*

Симетикон, який входить до складу препарату – це нетоксична інертна поверхнево-активна речовина, виготовлена на основі кремнію, є піногасником. Він змінює поверхневий натяг пухирців газу, що утворюються у кишечнику, і спричиняє їх руйнування. Газу, що вивільняються при цьому, можуть як поглинатися стінками кишечника, так і виводитися з організму завдяки перистальтиці кишечника.

Застосування симетикону до початку діагностичних досліджень органів черевної порожнини попереджає виникнення дефектів зображення, що спричиняються пухирцями газу; сприяє ретельному зрошенню слизової оболонки товстої кишки контрастною речовиною, що запобігає розриву контрастної плівки навіть у разі здуття кишечника.

#### *Фармакокінетика.*

Симетикон діє винятково на поверхні пухирців газу і не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту. Симетикон не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту і після перорального прийому виводиться у незмінному вигляді. Симетикон не має центральної дії.

### **Клінічні характеристики.**

#### **Показання.**

- ☐ Симптоматичне лікування порушень з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням, наприклад, метеоризм, у тому числі у післяопераційний період, коліки у немовлят.
- ☐ Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, ультразвукове дослідження) та при підготовці до гастродуоденоскопії.
- ☐ Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими миючими засобами).

#### **Протипоказання.**

- ☐ Підвищена чутливість до препарату та його компонентів.
- ☐ Кишкова непрохідність.
- ☐ Обструктивні захворювання травного тракту.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Левотироксин може зв'язуватися з симетиконом. Абсорбція левотироксину у кишечнику може бути порушена при одночасному прийомі з симетиконом.

#### **Особливості застосування.**

При повторній появі скарг або при триваліших скаргах з боку травного тракту слід звернутися до лікаря.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Клінічних даних щодо застосування препарату Колікід® вагітними немає. Оскільки активний компонент не всмоктується слизовою оболонкою травного тракту, не слід очікувати будь-якої дії лікарського препарату на плід або накопичення препарату у грудному молоці.

Застосування препарату Колікід® у період вагітності або годування груддю можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Оскільки симетикон є інертною речовиною, яка не абсорбується, вплив на керування автотранспортом або іншими механізмами практично виключений.

**Спосіб застосування та дози.**

*При порушеннях з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням*

| Вік                               | Дозування | Частота застосування                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діти віком до 1 року              | 0,5-1 мл  | Колікід® додавати у пляшку з дитячим харчуванням при кожному годуванні або за допомогою маленької ложки, давати до або після годування груддю |
| Діти віком 1-6 років              | 1 мл      | Препарат застосовувати під час або після вживання їжі кожні 4-6 годин                                                                         |
| Діти віком 6-14 років             | 1-2 мл    |                                                                                                                                               |
| Діти віком від 14 років і дорослі | 2 мл      |                                                                                                                                               |

*Для підготовки до діагностичних досліджень черевної порожнини:*

Рентгенологічні дослідження, ультразвукова діагностика

| Вік     | Дозування та частота застосування |                                      |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|         | За добу до проведення дослідження | Вранці у день проведення дослідження |
| Діти    | По 1 мл 3 рази на добу            | 1 мл однократно                      |
| Дорослі | По 2 мл 3 рази на добу            | 2 мл однократно                      |

Для підготовки до гастродуоденоскопії

| Вік     | Дозування та частота застосування |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Перед проведенням ендоскопії      | Під час проведення ендоскопії                                                                                                                       |
| Дорослі | 4-8 мл однократно                 | У випадку необхідності, ввести кілька мілілітрів суспензії через канал ендоскопа для усунення пухирів газу, що спричиняє перешкоди при дослідженні. |

*Як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (залежно від тяжкості отруєння)*

| Вік     | Дозування        |
|---------|------------------|
| Діти    | Від 2,5 до 10 мл |
| Дорослі | Від 10 до 20 мл  |

Колікід<sup>®</sup> можна застосовувати також у післяопераційному періоді.

Перед застосуванням вміст флакона треба добре збовтувати. Для вимірювання доз можна використовувати пластиковий разовий шприц без голки ємністю 2 мл. Препарат приймати під час або після їди, а у разі необхідності – перед сном.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг та вирішується лікарем індивідуально.

При необхідності Колікід<sup>®</sup> можна застосовувати протягом тривалого часу.

При повторному виникненні порушень з боку травного тракту та/або у випадку їх тривалого характеру слід провести клінічне обстеження.

#### *Діти.*

Препарат застосовувати дітям від народження.

#### ***Передозування.***

До цього часу випадки передозування невідомі. Оскільки симетикон у хімічному та фізіологічному відношенні є інертним, то інтоксикація практично виключена. У разі застосування більших доз, ніж рекомендовано, слід звернутися до лікаря.

#### ***Побічні реакції.***

*З боку імунної системи:* алергічні прояви, реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, шкірний висип, кропив'янку.

#### ***Термін придатності.***

3 роки.

#### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Після першого відкриття флакона препарат зберігати не більше 4 тижнів.

#### ***Упаковка.***

По 30 мл або 60 мл суспензії у флаконі, або по 30 мл у банці. Кожен флакон або банка в картонній упаковці разом з мірною ложкою.

#### ***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

#### ***Виробник.***

ТОВ «КУСУМ ФАРМ».

#### ***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

Україна, 40020, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 54.