

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПОВІДИН
(POVIDIN)

Склад лікарського засобу:

доюча речовина: povidone-iodine;
1 супозиторій містить повідон-йод у перерахуванні на суху речовину, яка містить 10 % вільного йоду 300 мг (0,3 г);
допоміжні речовини: натрію фосфат дodeкагідрат, поліетиленоксид 400,
поліакрилонікіт 1500.

Лікарська форма. Супозиторій вагінальний.

Супозиторій від коричневого до темно-коричневого кольору, кулеподібної форми, зі специфічним запахом.

Назва та місцезнаходження виробника. АТ « Лекхім-Харків ».

Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партизанського, 36.

Фармакотерапевтична група. Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології. Код ATC G01A X11.

Супозиторій чинять антисептичну (бактерицидну, фунгіцидну, віруліцидну) дію, включаючи мікрофлору із полірезистентністю до хіміотерапевтичних препаратів. Чинять протизапальну дію, зумовлену гіперосмолярними властивостями гідрофільнної основи. Повідон-йод являє собою водорозчинну комплексну сполуку йоду із синтетичним нетоксичним полімером полівінілпіролідоном. При контакті зі шкірою або зі слизовою оболонкою з комплексу вивільняється іонізований йод, що виявляє виражену антисептичну дію внаслідок високої окиснювальної здатності. Завдяки цьому повідон-йод має виражену бактерицидну, фунгіцидну, спороцидну, вибрковий протиірусний ефект, активний відносно найпростіших.

При місцевому застосуванні майже не відбувається резорбція йоду зі слизової оболонки.

Показання для застосування.

Лікування гострих та хронічних вагінітів і колпітів, спричинених змішаною інфекцією, трихомонадних колпітів і грибкових уражень піхви.

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до йоду, герпетiformний дерматит Дюринга; аденона щитовидної залози; гіпертиреоз, ниркова недостатність. Не рекомендується призначати препарат дітям, жінкам у період вагітності або годування грудлю. Період перед та після терапії радіоактивним йодом.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У разі неманіфестного гіпертиреозу та інших захворювань щитовидної залози, особливо у хворих літнього віку, препарат застосовують при постійному лікарському контролі. Активність зменшується у кислому середовищі. Під час лікування рекомендується застосовувати гігієнічні прокладки, щоб уникнути забруднення білизни.

Загальноприйнятого чи тривалого застосування повідон-йоду необхідно уникати пацієнтам при лікуванні препаратами літію, печінковій недостатності, захворюваннях щитовидної залози. Застосування повідон-йоду може зменшити поглинання йоду щитовидною залозою, що може вплинути на результати деяких дослідження (сциніграфії щитовидної залози, визначення блокувача йоду, діагностичні процедури з використанням радіоактивного йоду). При плануванні вказаних процедур у застосуванні повідон-йоду необхідно зробити перерву не менше ніж на 1-4 тижні.

Окислювальна дія повідон-йоду може стати причиною корозії металів, тоді як пластмасові і синтетичні матеріали зазвичай нечутливі до повідон-йоду. В окремих випадках можлива зміна кольору, який зазвичай відновлюється.

Повідон-йод легко видається з текстильних і інших матеріалів теплою водою з милом. Плями, які важко видаляються, слід обробити розчином аміаку чи тіосульфатом натрію.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування грудлю.

Не слід призначати препарат жінкам у період вагітності або годування грудлю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Немає даних.

Діти.

Препарат не призначають дітям.

Способ застосування та доза.

Вводять вагінально, по одному супозиторію на добу, перед сном, протягом 14 днів. Перед введенням супозиторій необхідно змочити водою. У разі необхідності, залежно від інфекції, супозиторії можна застосовувати 2 рази на добу та протягом усього менструального циклу, включаючи дні менструації.

Передозування.

Посилення побічних реакцій, алергічні реакції. Рекомендовано зменшити частоту застосування або повністю відмінити препарат.

Для гострої йодної інтоксикації характерні наступні симптоми: металевий присмак у роті, підвищене слиновиділення, печія, біль у роті або глотці; подразнення і набряк очей; шкірні реакції; шлунково-кишкові порушення; порушення функцій нирок, анури; недостатність кровообігу; набряк горла з вторинною асфіксією, набряк легенів, метаболічний ацидоз, гіпернатріємія, порушення обміну речовин.

Лікування: проводять підтримуючу і симптоматичну терапію з контролем електролітного балансу, функцій нирок і щитовидної залози.

При інтоксикації, зумовленій прийомом препарату внутрішньо, показано негайнє введення харчових продуктів, що містять крохмаль або білок (наприклад, розчин крохмалю у воді або молоко), промивання шлунка 5 % розчином тіосульфату натрію або у разі потреби внутрішньовенне введення 10 мл 10 % розчину тіосульфату натрію з тригодинними інтервалами.

У разі передозування токсичної концентрації йоду у сироватці крові можна ефективно зменшити перитонеальним діалізом чи гемодіалізом.

У разі появи ознак гіпертиреозу, викликаних йодом, рекомендується відповідне лікування.

Побічні реакції.

Можливі неприємні відчуття у паховій ділянці, свербіж, які виникають рідко та мають тимчасовий характер.

Можливий розвиток болісної чутливості, шкірних реакцій підвищеної чутливості у вигляді висипання на шкіру, крапив'янки, свербежу, гіперемії. В окремих випадках можливі генералізовані реакції гіперчутливості зі зниженням артеріального тиску і/або задухою, антионевротичний набряк, анафілактичний шок (анафілактичні реакції).

При появі ознак місцевих реакцій непереносяністі (подразнення та чутливість) слід припинити застосування препарату.

Описані випадки гіпотиреозу та гіпертиреозу. Екстенсивне та тривале місцеве застосування повідон-йоду іноді може спричинити нейтропенію.

Препарат може викликати сперміцидну дію і його не слід застосовувати, коли бажане запліднення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

Препарат не можна застосовувати одночасно з радіоактивним йодом, дезінфекційними засобами, які містять хлоргексидин, сульфадіозин срібла, ртуть і лут, через можливу часткову неактивність. Одночасне застосування препарату з літієм може спричинити синергічний гіпотиреоїдний ефект.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. У захищенному від світла місці при температурі не вище +15 °C.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у блістері, по 1 або 2 блістері у пачці.

Умови відпуску. Без рецепта.