

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДАЛАРГІН-ФАРМСИНТЕЗ
(DALARGIN-PHARMSYNTHESIS)

Склад:

діюча речовина: dalargin;

1 мл розчину містить даларгіну 1 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота оцтова, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на травний тракт та метаболічні процеси.

Код АТХ A16A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Даларгін – пептидна сполука (тирозин-2-аланіл-гліцин-феніланіл-лейцил-аргініну діацетат), до структури якої входять залишки 6 амінокислот. Даларгін відноситься до засобів, які регулюють метаболічні процеси. Препарат прискорює загоювання виразок шлунка та дванадцятипалої кишки, знижує кислотність шлункового соку за рахунок антисекреторної активності. Даларгін має також гіпотензивний вплив. Спостерігається позитивний вплив даларгіну на психічні функції хворих на алкоголізм.

Фармакокінетика. Не досліджувалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії: загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки при довготривалому рубцюванні виразки; облітеруючі захворювання нижніх кінцівок; порушення психічного стану при алкоголізмі; панкреатит, панкреанекроз.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена артеріальна гіпотензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Якщо існує виражений больовий симптом, одночасно з препаратом Даларгін-Фармсинтез слід призначати антацидні засоби.

Особливості застосування.

Інформація відсутня.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності препарат протипоказаний.

При необхідності лікування препаратом слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не вивчена.

У випадках, якщо під час лікування препаратом спостерігається запаморочення, слід утриматися від керування транспортними засобами або робіт з іншими механізмами

Спосіб застосування та дози.

Даларгін-Фармсинтез слід вводити внутрішньом'язово та внутрішньовенно.

При виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки або облітеруючих захворюваннях нижніх кінцівок разова доза препарату Даларгін-Фармсинтез становить 1-2 мл (1-2 мг).

Внутрішньом'язові ін'єкції вводять 2 рази на добу, внутрішньовенні – 1 раз на добу. Максимальна добова доза (при внутрішньом'язовому введенні) – до 5 мл (5 мг). Курс лікування триває 3-4 тижні. Загальна доза препарату Даларгін-Фармсинтез на курс лікування становить 30-50 мг.

При психічних розладах алкогольного генезу внутрішньовенно вводити 1 мг даларгіну в 10 мл 0,9 % розчину натрію хлориду для ін'єкцій.

При гострому панкреатиті препарат вводити внутрішньовенно: у перший день – 2 мл (2 мг), потім по 5 мл (5 мг) 1-2 рази на день. Курс лікування – від 4 до 6 днів.

При панкреанекрозі вводити внутрішньовенно по 5 мл (5 мг) 3-4 рази на добу (через 6-8 годин). Курс лікування – від 2 до 6 днів.

Діти. Інформація про безпеку та ефективність застосування препарату Даларгін-Фармсинтезіям відсутня, тому не рекомендується призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.

Передозування. Не описане.

Побічні реакції.

- *Серцево-судинні порушення* зниження артеріального тиску, головний біль, запаморочення, біль за грудиною, тахікардія, оніміння верхніх кінцівок;
- *порушення дихальної системи:* почастішання або утруднення дихання;
- *порушення в організмі в цілому:* алергічні реакції, у тому числі свербіж, гіперемія, кропив'янка, почервоніння або печіння шкіри обличчя, озноб, підвищення температури тіла;
- *порушення шлунково-кишкового тракту:* нудота, біль у епігастрії.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Несумісність. Не застосовувати розчинники, не вказані у розділі «Спосіб застосування та дози».

Упаковка. По 1 мл в ампулах; по 10 ампул у коробці або по 5 ампул в 1 блістері, по 2 блістери у коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

АТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ».

Місцезнаходження.

Україна, 61115, Харківська обл., місто Харків, вулиця сімнадцятого Партз'їзду, будинок 36.

Заявник.

ТОВ «ФАРМСИНТЕЗ».

Місцезнаходження.

Україна, 61052, м. Харків, вул. Чоботарська, б. 34, к. 10.