

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

### ВІПРАТОКС (VIPRATOX)

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 1 г лініменту містить отрути гюрзи 16 МОД 0,0176 мг, саліцилової кислоти 10 мг, камфори рацемічної 30 мг, ялицевої олії 30 мг;  
*допоміжні речовини:* натрію хлорид, олія соняшникова, парафін білий м'який, гліцерин, емульгатор Т-2, вода очищена.

#### Лікарська форма. Лінімент.

Лінімент білого кольору з характерним запахом камфори та ялицевої олії.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».  
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».  
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4

#### Фармакотерапевтична група.

Препарати, які застосовуються місцево при болю у суглобах та м'язах.  
Код АТС M02A X10.

Властивості препарату зумовлені дією активних інгредієнтів.

Завдяки *камфорі* препарат проявляє місцевоподразнювальну, анагезуючу та протизапальну дії та, збуджуючи чутливі нервові закінчення шкіри, покращує трофіку тканин.

*Токсини отрути гюрзи* поділяються на: постсинаптичні нейротоксини, які специфічно блокують н-холінорецептори субсинаптичної мембрани скелетної мускулатури і деяких відділів центральної нервової системи, пресинаптичні нейротоксини, які діють на пресинаптичні нервові закінчення і порушують вивільнення медіаторів, та мембраноактивні нейротоксини, які діють активно на мембрани клітин, в тому числі збуджують, викликаючи їх деполаризацію. Поряд зі специфічною дією, яка безпосередньо залежить від складових частин отрути, її лікувальний ефект пов'язаний з рефлекторними реакціями, які виникають у зв'язку з подразненням рецепторів, з подразненням біогенних речовин, які утворюються при місцевій дії препарату на тканини, з впливом на імунологічні реакції організму, а також зі стимуляцією системи «гіпофіз – надниркові залози».

*Саліцилова кислота* при зовнішньому застосуванні має антисептичну, подразнювальну, відволікаючу та кератолітичну дію, сприяючи кращому проникненню діючих компонентів.

*Ялицева олія* завдяки високій ліпофільності легко проникає через епідерміс, чинить подразнювальну дію на закінчення чутливих нервів як поверхневих судин, так і судин більш глибоко розташованих тканин.

**Показання для застосування.** Симптоматичне лікування болю при ревматизмі, невралгії, ішіасі, люмбаго, радикуліті, міалгії, артралгії.

**Протипоказання .** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострий туберкульоз легенів, порушення мозкового та коронарного кровообігу, схильність до виникнення ангіоспазмів, тяжкі порушення функції нирок і печінки, гнійничкові захворювання шкіри, пошкодження цілісності шкіри у місці нанесення препарату.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції.

Не допускати потрапляння препарату в очі, на відкриті рани та на слизові оболонки. При випадковому потрапленні в очі або на слизові оболонки необхідно ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

З обережністю застосовувати пацієнтам літнього віку.

#### Особливі застереження.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Протипоказане у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

**Діти.** Не застосовують дітям до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.** Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість лініменту на шкіру для визначення індивідуальної чутливості до препарату.

Залежно від розміру поверхні болісної ділянки лінімент наносити невеликими порціями 540 г та ретельно втирати в шкіру 1-2 рази на добу до зникнення больового симптому. Курс лікування визначає лікар залежно від тяжкості перебігу захворювання та ефективності лікування.

**Передозування.** При випадковому потрапленні на слизові оболонки мазь спричинює сильне подразнення. Можливі алергічні реакції (свербіж, дерматит, лущення шкіри)Р екомендується припинити застосування лініменту та змити його залишки зі шкіри. У разі необхідності показане симптоматичне лікування.

**Побічні ефекти.** Можливі місцеві алергічні реакції (у т.ч. свербіж, печіння, висипання, сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, кропив'янка), підвищення температури тіла.

**Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій .** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі 8-20 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 40 г у тубі в пацці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.