

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

КЕТО ПЛЮС (KETOPLUS)

Склад:

Основні речовини: 100 мл шампуню містить кетоконазолу 2 г, цинку пірітіону 1 г (у вигляді 48 % суспензії);
допоміжні речовини: алюмініо-магнієвий сілікат, пропіленгліколь, гідроксипропілметилцелюз, кремнію діоксид колоїдний безводний, імідосечовина, кислота хлористоводнева концентрована, віддушка «Швейцарський букет» Р3043, барвник кармозин (Е 122), вода очищена, перламутрова однорідна основа для шампуню.

Лікарська форма. Шампунь.

Основні фізико-хімічні властивості: в'язкий шампунь рожевого кольору з присмінним запахом.

Фармакотерапевтична група.

Протигрибкові препарати для місцевого застосування. Код ATХ D01A C.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Фармакологічні властивості шампуню зумовлені властивостями активних речовин, що входять до його складу: кетоконазолу та цинку пірітіону. Кетоконазол – протигрибковий препарат групи похідних імідазолу. Спричиняє фунгістатичну та фунгіцидну дії шляхом гальмування біосинтезу важливих складових мембрани грибів ергостеролу, що призводить до змін ліпідного складу мембрани та руйнування клітин. Активний щодо дерматофітів роду *[Trichophyton]*, *[Microsporum]*, *[Epidermophyton]*, *[Mycosphaerella]* дріжджових та дріжджеподібних грибів роду *[Candida]*, *[Malassezia furfur]* та *[Pityrosporum ovale]*. Цинку пірітіон гальмує ріст низки грампозитивних та грамнегативних бактерій, окрім видів грибів. Цинку пірітіон зумовлює противесеборейну дію препарату та діє проти лупи. Шампунь з кетоконазолом зменшує лущення та свербіж, що часто асоціюється з лупою, себорейним дерматитом, та висівкоподібним лишаем.

Фармакокінетика.

Спеціальні дослідження фармакокінетики шампуню не проводилися, але відомо, що кетоконазол та цинку пірітіон при зовнішньому застосуванні практично не всмоктуються до системного кровотоку і не спричиняють системної дії.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування і профілактика грибкових захворювань шкіри волосистої частини голови, що супроводжуються лущенням і свербежем шкіри, таких як:

- лупа;
- себорейний дерматит;
- локальний висівкоподібний лишай волосистої частини голови.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до кетоконазолу, цинку пірітіону або до будь-якого іншого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.

При призначенні шампуню пацієнтам, які тривалий час лікувалися глюкокортикоістериодами для місцевого застосування, слід продовжувати лікування останніми і відмінити їх поступово впродовж 2-3 тижнів (щоб уникнути синдрому відмінії).

Враховуючи відсутність значної системної абсорбції, взаємодія з іншими лікарськими засобами малоявовірна.

Не рекомендується застосовувати одночасно з дерматологічними препаратами, які містять глюкокортикоістериоди.

Особливості застосування.

Препарат призначений тільки для зовнішнього застосування.

При застосуванні препарату слід запобігати його потраплянню в очі та на слизові оболонки.

У разі потрапляння препарату в очі слід ретельно промити їх водою.

Себорейний дерматит та лупа часто супроводжуються посиленням випадання волосся, що може в окремих випадках деякий час тривати і на початку застосування шампуню.

Застосування у період вагітності або годування грудю.

У період вагітності або годування грудю препарат можна застосовувати лише у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням шампунь слід добре збоптати.

Наносити шампунь слід на вологе волосся і шкіру голови на 3-5 хвилин, після чого промити водою. При лікуванні лупи і себорейного дерматиту застосовувати шампунь слід 2 рази на тиждень упродовж 2-4 тижнів; при лікуванні висівкоподібного лишая – щоденно впродовж 5 днів.

Для профілактики лупи і себорейного дерматиту застосовувати шампунь слід 1 раз на тиждень або 1 раз на 2 тижні. Для профілактики висівкоподібного лишая – 1 раз на добу впродовж 3 днів перед початком літнього сезону (разовий курс лікування).

Діти.

Досвід застосування препарату дітям відсутній.

Передозування.

Оскільки шампунь призначений тільки для зовнішнього застосування і при цьому кетоконазол практично не абсорбується у системний кровотік, розвиток симптомів передозування малоявовірний. При випадковому проковтуванні шампуню внутрішньо застосовувати тільки підтримуючі та симптоматичні заходи. Забороняється викликати блювання та проводити промивання шлунка для запобігання аспірації.

Побічні реакції.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: еритема, відчуття печіння шкіри, свербіж, акне, контактний дерматит, подразнення шкіри, висипання, пустульозні висипання у місці нанесення, крапив'янка, сухість шкіри, посилення лущення шкіри, відчутия дискомфорту, гіперчувствливість.

З боку приладів шкіри: фолікуліт, зміна структури волосся, підвищена сухість або жирність волосся, випадання волосся (алопеція), зміна кольору волосся (загалом у пацієнтів із хімічно ушкодженим або сивим волоссям), знецвірлення нігтів. Відомі випадки розрізмлення волосся, від природи куцерявого.

З боку нервової системи та органів чуття: подразнення очей, набряк повік, підвищена слюзотеча, порушення смаку (дисгевзія), парестезії.

З боку імунної системи: реакції гіперчувствливості, у тому числі анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищенному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 60 мл або 150 мл шампуню у флаконі; по 1 флакону у картонній упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Дільниця № E-37/39, Ем. Аї. Ді. Сі., Сатпур, Насік-422 007, Махараштра, Індія.
Plot No. E-37/39, M.I.D.C., Industrial Estate, Satpur, Nasik-422 007, Maharashtra , India.