

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

**ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ
(FLORES HELICHRYSI ARENARII)**

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: цмину піщаного квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Суцільна сировина: кошики кулясті, поодинокі або по декілька разом на коротких шерстисто-повстяних квітконосах довжиною до 1 см, діаметром близько 7 мм. Кошики складаються із численних квіток, розташованих на голому квітколожі, оточених численними нещільно притиснутими листочками обгортки. Усі квітки трубчасті, п'ятизубчаті, двостатеві, із чубчиком. Листочки обгортки утнути, сухі, плівчасті, блискучі, зовнішні – яйцевидні, середні – лапатчасті, подовжені, внутрішні – вузькі, лінійні.

Колір обгортки лимонно-жовтий, квіток – лимонно-жовтий або оранжевий. Запах слабкий, присмінний. Сmak пряно-гіркий.

Подрібнена сировина та порошок крупний: суміш шматочків квіток, квітконосів та обгорток кошиків різноманітної форми. Колір залишків обгортки лимонно-жовтий, квіток – лимонно-жовтий або оранжевий. Запах слабкий, присмінний. Сmak пряно-гіркий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Код АТС А05А Х.

Препарати цмину, які містять флавоноїди, дiterpenovий спирт, стероїдні сполуки, барвники фенольного ряду, жирні кислоти, інозит, ефірну олію, належать до жовчогінних засобів, збільшують жовчовиділення, зменшують концентрацію жовчних кислот і вміст білірубіну в жовчі, змінюють співвідношення холестерин/жовчні кислоти у бік збільшення холатів, підсилюють тонус жовчного міхура, стимулюють секреторну функцію шлунка та підшлункової залози, підвищують діурез.

Показання для застосування. Застосовувати як жовчогінний засіб при хронічних захворюваннях печінки і жовчного міхура (хронічних холециститах, холецистоангіохолітах, жовчокам’яній хворобі, хронічних гепатитах, дискінезії жовчовивідних шляхів).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Обтураційна жовтяниця, жовчокам’яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі. Гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози.

Дитячий вік до 3 років.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Немає протипоказань щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Способ застосування та дози. 3-4 г квіток (1 столова ложка) покласти в смальованій посуд, залити 200 мл (1 склянка) гарячої кип’ячені води, закрити кришкою і нагріти у киплячій воді (на водяній бані) 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі і проідіти. Сировину, що залишилася, віджати, об’єм одержаного настою довести кип’яченю водою до 200 мл.

Дорослим приймати у теплом угляді по 1/2 склянки 2-3 рази на день за 15-20 хв до їди.

Дітям віком 3-7 років – по 1 десертній ложці, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 12-14 років – по 2 столові ложки, старше 14 років – по 1/4 склянки 2-3 рази на день за 15-20 хв до їди.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтувати.

Тривалість курсу лікування визначається індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільноті досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування. Не спостерігалося.

Побічні ефекти. Можливе виникнення алергічних реакцій (у т.ч. висипи, крапив'янка, свербіж, гіперемія та набрякання шкіри), підвищення артеріального тиску (при тривалому застосуванні хворим на артеріальну гіпертензію).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не досліджена.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C не більше 2-х діб.

у недоступному для дітей місці. Приготований відвар – у прохолодному місці

Упаковка. По 20 г або 40 г, або 50 г у пакети з вкладанням у пачку; по 1,5 г у фільтр-пакети з наступним вкладанням по 20 фільтр-пакетів у пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.