

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ
(FRUCTUS ANETHI GRAVEOLENTIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: кропу пахучого плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Окремі напівплодики (мерикарпії), рідко суцільні плоди (вислоплідники) довжиною 3– 7 мм, шириною 1,5– 4 мм. Мерикарпій широкоеліптичний, слабоопуклий зі спинного боку та плоский – з внутрішнього. Кожен мерикарпій з трьома нитковидними спинними ребрами та двома плоскими криловидними боковими.

Колір плодів зеленкувато-бурий або бурий, ребер – жовто-бурий. Запах сильний ароматний. Смак солодкувато-пряний, трохи пекучий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69050, м . Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Антацидні, противиразкові і вітрогонні засоби. Код АТС А02Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, спазмолітичну, сечогінну і вітрогінну дію; підвищують секрецію шлункових залоз, регулюють моторику кишечника, проявляють відхаркувальні властивості.

Показання для застосування.

Метеоризм; запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед вживанням настій рекомендується збовтувати .

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане у період вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 6 місяців.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по 1/5 склянки; при захворюваннях верхніх дихальних шляхів 4-5 разів на добу – по 1/2-1 столовій ложці. Дітям 7-14 років – по 1 десертній ложці,

3-7 років – по 1 чайній ложці, дітям від 6 місяців до 3 років – по 1/2 чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15-20 хвилин. Приймати у теплому вигляді за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по 1/5 склянки; при захворюваннях верхніх дихальних шляхів 4-5 разів на добу – по 1/2-1 столовій ложці. Дітям 7-14 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці, дітям від 6 місяців до 3 років – по 1/2 чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хв до їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

В осіб із підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.