

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ШАВЛІЇ НАСТОЙКА
(SALVIAE TINCTURA)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини : 1 флакон містить настойки шавлії листя (*Salviae folia*) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 40 мл.

Лікарська форма.Настойка.

Прозора рідина зеленувато-бурого кольору, зі специфічним ароматним запахом; при зберіганні допускається утворення осаду.

Назва і місце знаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Україна, 10014, Житомирська обл.,
місто Житомир, Корольовський район, вул. Лермонтовська, будинок 5.

Фармакотерапевтична група.Препарати, що сприяють загоюванню (рубцюванню) ран і виразок. Код АТС D03AX.

Біологічно активні речовини шавлії листя (ефірна олія, дубильні речовини, сапоніни, фітонциди, смоли) чинять протимікробну, протизапальну, в'яжучу, дезінфікуючу дію.

Показання для застосування.

- Запальні захворювання слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, пародонтоз), глотки, мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх дихальних шляхів.
- Інфіковані рани, порізи, опіки шкіри.

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Клінічний досвід застосування препарату дітям віком до 12 років відсутній

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням збовтати.

Для полоскання порожнини рота застосовувати у вигляді свіжоприготованого розчину: 1 чайну ложку шавлії настойки розвести у склянці теплої кип'яченої води.

Для місцевих аплікацій розвести 20-60 крапель настойки в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання, досягнутого лікувального ефекту та становить 7-14 днів.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння та набряк шкіри, висипання, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Шавлії настойка посилює дію інших протизапальних засобів.

Термін придатності.3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 мл у флаконі в пачці або по 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.