

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
  
**САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА**  
**(SALICYLIC ACID)**

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: саліцилова кислота;  
1 мл розчину містить саліцилової кислоти 20 мг;  
допоміжна речовина: спирт етиловий 70 %.

**Лікарська форма.**

Розчин нашкірний спиртовий.  
Прозора безбарвна рідина зі спиртовим запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Фармак».  
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

**Фармакотерапевтична група.**

Дерматологічні засоби. Код АТС D01A E12.

Антисептичний засіб. При місцевому застосуванні чинить протимікробну, подразнювальну, відволікачу дію.

**Показання для застосування.**

Застосовують при інфекційних ураженнях шкіри: звичайних вуграх, піодермії.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не допускати потрапляння препарату в очі, не наносити на слизові оболонки.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

Не слід наносити препарат на великі ділянки шкіри.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

**Способ застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо, змащуючи або розтираючи уражені ділянки шкіри ватним тампоном, просоченим препаратом 2-3 рази на добу. Курс лікування визначає лікар залежно від перебігу та тяжкості захворювання.

**Передозування.**

При застосуванні великих доз препарату може посилитися кератолітична дія та алергічні реакції. У такому разі препарат необхідно змити водою, звернутися за консультацією до лікаря. Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.**

Можливі зміни з боку шкіри: сухість, лущення, подразнення, контактний дерматит, прояви алергічних реакцій (кропив'янка, свербіж), що потребують відміни препарату.

При тривалому застосуванні можливе всмоктування препарату в загальний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, пришвидшене дихання.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Місцеве застосування саліцилової кислоти не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїл-пероксидом і місцевими ретиноїдами.

Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів для місцевого застосування і тим самим збільшити їх потрапляння в організм. Крім того, саліцилова кислота може посилити небажану дію метотрексату і гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів похідних сульфонілсечовини.

*Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікарю.*

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

В захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.