

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 %**  
**(ETHANOL 96 %)**

**Склад:**

діюча речовина: етанол;

містить при температурі 20 °С не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також воду.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакокінетика.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцево-подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Дезінфекція шкіри рук.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

**Особливі заходи безпеки.**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

**Особливості застосування .**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

**Передозування.**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

**Побічні реакції.**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.*

**Термін придатності.**

5 років.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 100 мл у флаконі.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник/заявник.**

ПАТ «Галичфарм», Україна.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності/ місцезнаходження заявника та/або представника заявника.**

Україна, 79024, м . Львів, вул. Опришківська, 6/8.