

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ПСОРИНОХЕЛЬ Н
(PSORINOHEEL N)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 г препарату містять: Bacillinum humanum Nosode D12 – 5 г, Bufo Bufo D10 – 10 г, Cicuta virosa D5 – 5 г, Medorrhinum Nosode D12 – 10 г, Natrium chloratum D12 – 10 г, Nerium oleander D4 – 5 г, Psorinum Nosode D10 – 10 г, Sulfur D6 – 10 г, Thuja occidentalis D6 – 10 г, Vaccininum Nosode D8 – 10 г, Kaliumtetraiodobismutatum D5 – 5 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат дезінтоксикаційної, імунокоригуючої, протиексудативної, протизапальної, антидегенеративної та антинеопластичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні хронічних запальних та дегенеративних захворювань (у т.ч. нейродерміт, атопічний дерматит, екзема, псоріаз, цироз печінки, нефрит, нефроз), алергічних захворювань.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем. Препарат доцільно застосовувати для закріплення (поглиблення) результатів комплексної терапії, продовження досягнутої ремісії та попередження подальшого прогресування хронічних захворювань.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Питання про можливість застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям від 6 років.

Досвід застосування препарату дітям до 6 років відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дітям від 6 до 12 років – 5 крапель, дітям від 12 років і дорослим – 8-10 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Ослабленим дітям і дорослим при тривалому та прогресуючому перебігу хронічних захворювань, деяких супутніх захворюваннях прийом препарату необхідно розпочинати з малих доз (1-2 краплі), збільшуючи щоденно або через день на 1-2 краплі, доводячи до разової вікової дози.

Тривалість лікування та частоту прийому визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

Зазвичай курс лікування становить 4-8 тижнів.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні ефекти.

Реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.