

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %, 10 %

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: сульфаниламід;

1 г мазі містить сульфаниламіду 50 мг (0,05 г) або 100 мг (0,1 г);

допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або світло-жовтого кольору. За зовнішнім виглядом має бути однорідною.

Назва і місце знаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Сульфаниламіди. Код ATC D06B A05.

Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікроною клітиною факторів фосту – фолієвої кислоти та аналогічних речовин, які мають у своєму складі парааміnobензойну кислоту (ПАБК), тобто внаслідок схожості структури ПАБК і сульфаниламіду останній є конкурентним антагоністом кислоти на рівні біохімічних систем мікроорганізмів.

Показання для застосування. Виразки, опіки, тріщини, ранні, піодермії, бешихове запалення та інші гнійно-запальні процеси шкіри.

Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищенні чутливості до будь-якого компонента препарату, нирковій недостатності, гострій порфірії, а також у період вагітності або годування груддю.

Належні заходи безпеки при застосуванні. При появі алергічної реакції в місці нанесення мазі, слід припинити застосування препарату. Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаниламідів мікроорганізмів.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказане застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Безпека та ефективність застосування Стрептоцидової мазі дітям не встановлені, тому застосовувати препарат дітям не рекомендується.

Способ застосування та дози. Стрептоцидову мазь наносить тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку. Кратність та тривалість застосування визначається лікарем і залежить від тяжкості захворювання і досягнутого терапевтичного ефекту.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи дерматит, крапив'янку.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Під час застосування Стрептоцидової мазі небажано приймати такі препарати як дигітоксин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид.

Новокайн, який містить залишок парааміnobензойної кислоти, знижує ефективність препарату, якщо ці лікарські засоби застосовували одразу один за одним.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г у тубах у пачці або без пачки або в контейнерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.