

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ

(за Вишневським)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: дьоготь березовий, ксероформ;

1 г лініменту містить дьогтю березового - 30 мг, ксероформу – 30 мг;

допоміжні речовини : кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.

Лікарська форма

Лінімент.

Однорідний лінімент від ясно-жовтого до бурого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місце знаходження виробника ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола» .

Україна, 69063, м Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A Х.

Препарат чинить слабку дезінфікуючу, в'язучу, місцеву подразнювальну дію. Внаслідок слабкої подразнювальної дії на рецептори тканин сприяє прискоренню процесу регенерації, нормалізуючи кровообіг у тканинах, посилюючи процеси ороговіння епідермісу.

Показання для застосування.

Абсцеси, фурункули, пролежні, лімфаденіти, лімфангіти, опіки, відмороження, трофічні виразки.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до дьогтю, ксероформу або до інших компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов'язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.

Не можна допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після нанесення лініменту слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот. У разі потрапляння промити великою кількістю води.

Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я погіршиться, або виникнуть небажані явища, необхідно припинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшої терапії.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не вивчалися, призначати його можна з урахуванням співвідношення користь-ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами не описаний.

Діти. Препарат не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим лінімент застосовувати зовнішньо: наносити на уражені ділянки шкіри. На рани накласти просочену препаратом стерильну серветку або стерильну пов'язку. Пов'язку змінювати 1 раз у 2-3 дні. Тривалість курсу лікування – від 6 до 20 днів.

Передозування. Не описане.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у тому числі шкірні висипання, свербіж). При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть утворюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

Термін придатності 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування.

Упаковка.

Контейнери по 25 г та 50 г; туби по 25 г та по 40 г у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.