

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАЛЬЦІУМ ФОСФОРИКУМ СІЛЬ ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 2
(CALCIUM PHOSPHORICUM SALT OF DR. SCHUESSLER№ 2)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить *Calcium phosphoricum D6* 250 мг (містить лактози моногідрат);
допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат .

Лікарська форма. Таблетки.

1

Білі або майже білі таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском "з одного боку « DHU », з іншого боку – «2») .

Назва і місцезнаходження виробника.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнаймідтель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе , Німеччина.

Фармакотерапевтична група.

Гомеопатич ний препарат.

Препарат є однією з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера .

Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно до теорії доктора Шюсслера , регулятори і розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездужання . Метод лікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму , гармонізуючи баланс мінеральних солей.

Фосфат кальцію (*Calcium phosphoricum*) – мінеральна сіль, що найчастіше зустрічається в організмі людини. Вона формує тверду кісткову тканину і виявляється в усіх клітинах організму.

Застосовують відповідно до « гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату) .

Кальцій фосфорикум (фосфат кальцію) - мінеральна сіль кісток і зубів. Вона сприяє нормалізації фосфорно-кальцієвого обміну, росту кісткової тканини у дітей.

Показання для застосування.

Застосовується як підтримуюче лікування при переломах і остеопорозі, при відставанні у рості, при захворюваннях кісткової системи.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.

У зв'язку з вмістом у препараті і пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Особливі застереження.

Препарат містить лактозу, що слід враховувати пацієнтам з непереносимістю лактози.

Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на целіакію.

Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Кальцій фосфорикум сіль доктора Шюсслера № 2 у педіатричній практиці може застосовуватися дітям усіх вікових категорій.

Спосіб застосування та дози.

Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

Вік пацієнта	Гострі стани (раптова поява симптомів)	Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу)
Діти старше 12 років та дорослі	1 таблетка максимально 6 разів на добу	1 таблетка 1-3 рази на добу
Діти віком від 6 до 11 років	1 таблетка максимально 4 рази на добу	1 таблетка 1-2 рази на добу
Діти віком від 1 року до 5 років	1 таблетка максимально 3 рази на добу*	1 таблетка 1 раз на добу **
Діти віком до 1 року	1 таблетка максимально 2 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.

** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину 1-3 рази на добу.

Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Передозування.

Передозування не спостерігалось.

Побічні ефекти.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо Ви спостерігаєте будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, проінформуйте про це лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дотепер не відомі.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.