

**КАЛИУМ ХЛОРАТУМ СІЛЬ
ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 4
(KALIUM CHLORATUM SALT OF DR. SCHUESSLER №4)**

діюча речовина: 1 таблетка містить *Kalium chloratum* D6 250 мг (містить лактози моногідрат);
допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат.

Білі або майже білі таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку «DNU», з іншого боку – «4»)		
--	--	--

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Гомеопатичний препарат.

Каліум хлоратум (хлорид калію) – мінеральна сіль слизових оболонок, особливо ефективна у другій фазі запалення, коли захворювання проходить із симптомами ексудації.

Запалення слизових оболонок шлунково-кишкового тракту, сечостатевої і дихальної систем (наприклад коліт, гастрит, цистит, бронхіт і риніт).

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на целиакію.

Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Не впливає.

Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Каліум хлоратум сіль доктора Шюсслера № 4 можна застосовувати дітям усіх вікових категорій.

Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

Вік пацієнта	Гострі стани (раптова поява симптомів)	Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу)
Діти старше 12 років та дорослі	1 таблетка максимально 6 разів на добу	1 таблетка 1-3 рази на добу
Діти віком від 6 до 11 років	1 таблетка максимально 4 рази на добу	1 таблетка 1-2 рази на добу
Діти віком від 1 до 5 років	1 таблетка максимально 3 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **
Діти віком до 1 року	1 таблетка максимально 2 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу **

Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Передозування не спостерігалось.

У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості. Якщо Ви спостерігаєте будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, проінформуйте про це лікаря.

Дотепер не відомі.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.

Без рецепта.