

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАГНЕЗІУМ ФОСФОР ІКУМ СІЛЬ
ДОКТОРА ШЮССЛЕРА № 7
(MAGNESIUM PHOSPHORICUM SALT OF DR. SCHUESSLER№ 7)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 таблетка містить *Magnesium phosphoricum D6* 250 мг (містить лактози моногідрат);
допоміжні речовини: крохмаль пшеничний, магнію стеарат .

Лікарська форма. Таблетки.

Білі або майже білі таблетки плоскоциліндричної форми зі скошеною кромкою і відтиском (з одного боку « DНU», з іншого боку – «7») .

Назва і місцезнаходження виробника.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсру е, Німеччина.

Фармакотерапевтична група.
Гомеопатичний препарат.

Препарат є однією з 12 потенційованих солей доктора Шюсслера .
Мінеральні солі необхідні організму для підтримання функцій клітин. Відповідно дотеорії доктора Шюсслера , регулятори і розлади функцій клітин часто призводять до розвитку захворювань та нездужання . Метод л ікування мінеральними солями доктора Шюсслера регулює функціональні здатності клітин організму , гармонізуючи баланс мінеральних солей.
Фосфат магнію (*Magnesium phosphoricum*) виявляється в скелетній та м'язовій системах людини, в нервах, головному і спинному мозку .
Застосовують відповідно до « гомеопатичного патогенезу» (клінічної характеристики препарату) .
Магnezіум фосфорикум (фосфат магнію) – мінеральна сіль, що застосовується при судомах та болях у м'язах.

Показання для застосування.
Лікування судом і спазмів м'язів, а так ож м'язових болей, наприклад спазмів шлунково-кишкового тракту , при менструац ії, що супроводжуються болем, та при малгіях в області шії та плеча.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого допоміжного компонента препарату.
У зв'язку з вмістом у препараті пшеничного крохмалю препарат протипоказаний пацієнтам з алергією на пшеницю.

Особливі застереження.
Препарат містить лактозу, що слід враховувати пацієнтам з непереносимістю лактози.
Препарат можна застосовувати пацієнтам, які страждають на цeliacію.

Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне загострення симптомів захворювання, що не є протипоказанням до застосування, а потребує тимчасового припинення прийому препарату та консультації лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Рекомендовано застосовувати препарат тільки після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.

Діти.
Як однокомпонентний гомеопатичний препарат Магnezіум фосфорикум сіль доктора Шюсслера № 7 у педіатричній практиці може застосовуватися дітям усіх вікових категорій.

Спосіб застосування та дози.
Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для застосування:

Вік пацієнта	Гострі стани (раптова поява симптомів)	Хронічні стани (наявність симптомів протягом тривалого часу)
Діти старше 12 років та дорослі	1 таблетка максимально 6 разів на добу	1 таблетка 1-3 рази на добу
Діти віком від 6 до 11 років	1 таблетка максимально 4 рази на добу	1 таблетка 1-2 рази на добу
Діти віком від 1 року до 5 років	1 таблетка максимально 3 рази на добу*	1 таблетка 1 раз на добу**
Діти віком до 1 року	1 таблетка максимально 2 рази на добу *	1 таблетка 1 раз на добу**

* Дітям віком до 5 років рекомендується розчиняти таблетку в 1 чайній ложці води.
** Розчинити 1 таблетку в 100 мл води і давати дитині по 15 мл (1 столова ложка) цього розчину 1-3 рази на добу.
Таблетку приймати за 30 хвилин до або після їди, даючи їй повільно розчинитися в роті.

Передозування.
Передозування не спостерігалось.

Побічні ефекти.
У зв'язку з вмістом пшеничного крохмалю при застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості . Якщо Ви спостерігаєте будь-які побічні явища, не описані в даній інструкції, проінформуйте про це лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Дотепер не відомі.

Термін придатності 5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.
Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 80 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску.
Без рецепта.