

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**СОЛІДАГОРЕН**  
**(SOLIDAGOREN®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 10 мл препарату містять 7,9 мл рідкого екстракту (1 : 1,5 - 2,1) із суміші трави золотушника звичайного (*Solidago virgaurea* L.), трави перстачу гусячого (*Potentilla anserina* L.), трави хвоща польового (*Equisetum arvense* L.) (4,2 : 1,4 : 1), екстрагент: етанол 50 % (об/об);  
*допоміжні речовини:* вода очищена, етанол 96 %.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Прозора рідина коричневого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ, Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина/  
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Steinfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТ Х G04В.

**Показання для застосування.**

Основна (базисна) терапія гострих та хронічних інфекцій сечовивідних шляхів, сечового міхура (цистит), нирок (пієлонефрит), а також у складі комплексної терапії цих захворювань.

Профілактика утворення каменів у сечовому міхурі, у тому числі й після їх видалення.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до активної речовини або будь-яких інших компонентів препарату. Солідагорен не слід застосовувати у разі алергії на рослини родини Айстрових (*Asteraceae*), оскільки ці рослини використовують при виробництві рослинного екстракту, який входить до складу препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Не рекомендується застосовувати Солідагорен як сечогінний засіб для лікування набряків, спричинених серцевою або нирковою недостатністю.

У разі появи крові у сечі, високої температури тіла або якщо симптоми захворювання зберігаються більше 5 днів, рекомендується звернутися до лікаря.

Препарат містить 45 % об/об спирту. З кожним прийомом рекомендованої дози (30 крапель) до організму потрапляє 0,6 г алкоголю.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю .*

Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю тільки після оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

При дотриманні рекомендованих доз не впливає на швидкість реакції.

***Діти.***

Препарат не призначений для застосування дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям віком від 12 років приймати внутрішньо по 20-30 крапель Солідагорену з 100-200 мл води 3 рази на день. 30 крапель відповідають 1,4 мл препарату.

Споживання рідини протягом доби при прийомі Солідагорену має становити не менше 1,5-2 л.

Про тривалість застосування препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Передозування.**

Повідомлення відсутні. У разі передозування можливе посилення побічних ефектів.

**Побічні ефекти.**

Дуже рідко спостерігаються реакції гіперчутливості та алергічні реакції, легкі шлунково-кишкові розлади.

У разі появи перших ознак алергічної реакції (наприклад висипу) прийом препарату слід припинити.

У разі появи побічних ефектів, що не вказані в інструкції, слід звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Через наявність алкоголю в цьому лікарському засобі можливий вплив на дію інших препаратів.

**Термін придатності.**

3 роки.

Після відкриття флакона – 3 місяці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 мл, 50 мл або 100 мл препарату у флаконі з коричневого скла з крапельницею та пластмасовою кришкою, що загвинчується. По 1 флакону в коробці з картону пакувального.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.