

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

СТИМОЛ®

(STIMOL®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: цитруліну малат;

1 пакетик містить цитруліну малату 1 г (еквівалентно 566,44 мг L-цитруліну та 433,56 мг DL-яблучної кислоти (Е 296));

допоміжні речовини: повідон, натрію гідрокарбонат, мальтодекстрин, сахарин натрію, ароматизатор полуничний.

Лікарська форма. Порошок шипучий для приготування орального розчину.

Білий порошок із запахом полуниці.

Назва і місцезнаходження виробника.

БІОКОДЕКС, Франція.

Юридична адреса: 7, авеню Гальєні, 94250 Жантиллі – Франція.

Адреса виробничої ділянки: 1 авеню Блез Паскаль, 60000 Бове, Франція.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Амінокислоти та їх похідні Код АТС А16А.

Цитруліну малат – це еквімолекулярна суміш яблучної кислоти та цитруліну.

Яблучна кислота стимулює цикл Кребса та активує механізм утворення енергії на клітинному рівні.

Цитрулін входить до циклу сечовини, активує утворення та виведення сечовини з організму.

Цитруліну малат швидко всмоктується у кишечнику. Максимальна концентрація досягається через 45 хвилин, перевищуючи вихідну концентрацію в 6-15 разів, і повертається до вихідного рівня через 5-6 годин. Препарат виводиться з сечею, перед цим він швидко елімінується з плазми.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування астенії

- фізична астенія;
- психічна астенія;
- постінфекційна астенія;
- післяопераційна астенія;
- астенія у літньому віці;
- астенія ендокринного походження (при цукровому діабеті);
- астенія у спортсменів (препарат знімає біль у м'язах та судоми, спричинені накопиченням лактату після фізичних навантажень та інтенсивних тренувань);
- вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом;
- алкогольно-абстинентний синдром;
- сексуальна астенія.

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Особливі застереження.

Один пакетик Стимолу® містить приблизно 100 мг натрію. Це необхідно враховувати при застосуванні препарату хворим, які перебувають на безсольовій дієті.

Враховуючи те, що у складі Стимолу® немає цукру, препарат можна застосовувати хворим на цукровий діабет.

Слід з обережністю застосовувати хворим на виразку шлунка або дванадцятипалої кишки.

Оскільки порошок, який міститься у пакетикує кислотою речовиною, його слід розводити у склянці води або підсолодженого напою та вживати під час прийому їжі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека застосування не встановлена, тому не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують внутрішньо, попередньо розчинивши вміст пакетика у склянці води (приблизно 100 мл) або підсолодженого напою (чай, сік, компот тощо), під час прийому їжі.

Дорослим: по 1 пакетику 3 рази на добу.

Дітям віком від 6 років: по 1 пакетику 2 рази на добу.

Рекомендований курс лікування – 4 тижні.

Передозування. Не описано.

Побічні ефекти.

У рідкісних випадках – гастралгія або відчуття печіння в шлунку на початку лікування.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій необхідно припинити лікування та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Порошок по 1 г у пакетику. По 18 пакетиків в картонній коробці

Категорія відпуску. Без рецепта.