

Інструкція про застосування
медичного імунобіологічного препарату
PROBIOLOG / ПРОБІОЛОГ

Загальна характеристика

основні властивості лікарської форми : білі капсули з порошком світло бежевого кольору.

Склад

1 капсула препарату містить:

Діюча речовина: *Lactobacillus acidophilus* (LA-5) та *Bifidobacterium lactis* (BB- 12) у загальній кількості 1×10^9 КУО/капсулу).

Допоміжні речовини: мальтодекстрин, кремнію диоксид, магнію стеарат, целюлоза мікрокристалічна, натрію альгінат, гіпромелоза, титанудиоксид.

Форма випуску: капсули №30 у тубах алюмінієвих.

Код за АТС: A07F A51.

Імунологічні і біологічні властивості

Кожна капсула препарату містить щонайменше 1×10^9 живих бактеріальних клітин (КУО). Препарат містить дві культури *Lactobacillus acidophilus* і *Bifidobacterium lactis*.

Молочнокислі бактерії, що входять до складу препарату є складовими нормальної мікрофлори кишечника людини, відіграють важливу роль у забезпеченні колонізаційної резистентності, імуностимулюючої, детоксикаційної функцій організму; стимулюють синтез вітамінів та нормалізують функціонування шлунково-кишкового тракту.

Молочнокислі бактерії виявляють антогоністичну дію по відношенню до ряду патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, зокрема стафілококів, бактерій кишкової групи, що пов'язано з їх здатністю виробляти молочну кислоту, лактоцини, перекис водню, оцтову, пропіленову кислоти, лізоцим.

Молочнокислі бактерії сприяють зниженню рН кишкового середовища, запобігають росту і розмноженню патогенної і умовно патогенної мікрофлори, сприяють нормалізації моторної функції кишечника.

Показання для застосування

- Лікування та профілактика кишкових дисфункцій, діареї;
- Нормалізація мікрофлори кишечника та процесу травлення під час та після лікування антибіотиками.

Спосіб застосування і дози

При кишкових розладах, діареї:

Дорослі: по 2 капсули на добу впродовж 4-7 днів;

діти віком від 7 років: по 1 капсулі на добу впродовж 4-7 днів.

Профілактика кишкових розладів (наприклад, під час подорожей):

По 1-2 капсули на добу впродовж 1 місяця.

Нормалізація мікрофлори кишечника та процесу травлення під час та після лікування антибіотиками:

Препарат слід приймати дорослим та дітям віком від 7 років в останні 3-4 дні курсу лікування антибіотиками по 1-2 капсулі щоденно в перервах між прийомом антибіотиків. Прийом препарату слід продовжити ще протягом тижня після завершення прийому антибіотиків.

Препарат приймають разом з їжею, запиваючи невеликою кількістю води.

Побічна дія Дані відсутні.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.

Особливості застосування

Запобіжні заходи

У випадку розвитку реакцій підвищеної чутливості необхідно негайно припинити застосування препарату.

Заборонено застосовувати препарат після закінчення терміну його придатності.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами

Препарат призначається в складі комплексної терапії разом з антибіотиками та іншими протибактеріальними препаратами.

Передозування

Даних щодо симптомів передозування немає.

Застосування при вагітності і годуванні груддю

Препарат можна застосовувати у періоди вагітності та годування груддю.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C у недоступному для дітей та захищеному від світла місці.

Термін придатності: 2 роки.

Пакування:

По 30 капсул у тубах алюмінієвих.

Виробник:

Chr. Hansen A/S, Данія для Laboratoires MAYOLY SPINDLER, Франція

Boge Alle 10-12, DK-2970 HorsholmДанія

Заявник:

Laboratoires MAYOLY SPINDLER,Франція

6, avenue de l'Europe, BP 51, 78401 CHATOUCEDX