

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СКИПИДАРНА МАЗЬ
(UNGUENTUM TEREBINTHINAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить: скипидару живичного 200 мг;
допоміжні речовини: парафін білий м'який, емульгатор Т-2, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору із запахом скипидару.
За зовнішнім виглядом мазь має бути однорідною.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ “Фітофарм”.
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.
Код АТС M02A X10.

Скипидарна мазь чинить відволікаючу, протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. Відволікаюча дія пов'язана зі здатністю проникати через епідерміс і спричиняти рефлекторні зміни внаслідок подразнення рецепторів шкіри.

Показання для застосування.

У комплексному лікуванні невралгій, міозитів, артритів.

Протипоказання.

Тяжкі захворювання нирок і печінки, захворювання шкіри різного характеру, підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі! Якщо мазь випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.
Не наносити на uszkodжені ділянки шкіри.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не відомо, чи проникає препарат у грудне молоко та проходить через плацентарний бар'єр при вагітності, тому застосування препарату в період вагітності та годування груддю протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід дотримуватися обережності під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, зважаючи на виникнення можливих побічних реакцій генералізованого характеру.
(див. “Побочні ефекти”).

Діти.

Досвід застосування препарату у дітей відсутній, тому мазь не рекомендується для застосування у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Скипидарну мазь застосовують у дорослих зовнішньо для розтирання болісних ділянок 2 – 3 рази на день. Тривалість застосування обумовлена перебігом захворювання.

У разі порушення стану при лікуванні необхідна консультація лікаря.

Передозування.

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних явищ.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості до препарату можуть з'явитися алергічні реакції місцевого характеру, в тому числі, свербіж, набряк, почервоніння шкіри, печіння, висип. В окремих випадках можуть з'явитися алергічні реакції генералізованого характеру, в тому числі, ядуха, прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, запаморочення, судоми, втрата свідомості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г у тубах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.