

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ТАУФОН
(TAUFON)

Склад:

діюча речовина: таурин;

1 мл крапель містить таурину 40 мг;

допоміжні речовини: метилпарагідроксibenзоат (Е 218), вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Трофічні засоби. Код АТС S01X A.

Клінічні характеристики.

Показання.

Дистрофічні ураження рогівки та сітківки ока, включаючи спадкові тапеторетинальні дегенерації; старечі, діабетичні, травматичні і променеві катаракти; як засіб стимуляції репаративних процесів при травмах рогівки; як додатковий засіб при лікуванні відкритокутової глаукоми.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози.

Тауфон призначають дорослим.

Для лікування катаракти призначають по 2-3 краплі 2-4 рази на день. Термін лікування – 3 місяці. Курс повторити з інтервалом в 1 місяць.

При травмах застосовувати по 2-3 краплі 2-4 рази на день протягом 1 місяця.

Для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих травм рогівки препарат вводять під кон'юнктиву по 0,3 мл 4 % розчину 1 раз на день протягом 10 днів. Курс лікування повторити через 6-8 місяців.

При відкритокутовій глаукомі Тауфон закапують по 2-3 краплі у кон'юнктивальний мішок 2 рази на день за 20-30 хвилин до застосування тимололу. Курс лікування визначається індивідуально.

Побічні реакції.

Препарат, як правило, добре сприймається. В окремих пацієнтів можливий розвиток алергічних реакцій, гіперемії кон'юнктиви, свербіжу, печіння та різи в очах.

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Ефективність та безпека застосування препарату у період вагітності або годування груддю не досліджувались.

Діти.

Ефективність та безпека застосування дітям не досліджувались.

Особливості застосування.

При відкритокутовій глаукомі препарат застосовують у поєднанні з тимололом за 30 хвилин до закапування тимололу.

20-

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не вивчалась.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При спільному застосуванні з очними краплями тимололу спостерігається потенційоване зниження внутрішньоочного та артеріального тиску.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Тауфон належить до препаратів аміноксилот, що стимулюють репаративні та регенераційні процеси при захворюваннях сітківки ока дистрофічного характеру, травматичних ураженнях ока, патологічних процесах, що супроводжуються різким порушенням метаболізму цих тканин. Як сполука, що містить сірку, препарат сприяє нормалізації функцій клітинних мембран, оптимізації енергетичних і обмінних процесів, підтриманню сталості електролітного складу цитоплазми клітин, гальмуванню синаптичної передачі (нейромедіаторна роль).

Фармакокінетика. При закапуванні Тауфон проникає в тканини ока, де і чинить свою специфічну дію. При застосуванні у терапевтичних дозах препарат практично не всмоктується у системний кровотік.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Термін придатності препарату після розкриття флакону – 28 діб.

Умови зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 5 мл або 10 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження. Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.