

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ПІВОНІЇ НАСТОЙКА

Склад:

діюча речовина: 1 флакон (банка) містить: настойку трави, кореневищ з коренями півонії незвичайної (*Paeoniae anomalae herba, rhizomata cum radicibus*) (1:10) (екстрагент – етанол 40 %) – 100 мл;
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина світло-коричневого кольору, з специфічним запахом. В процесі зберігання допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група.

Снодійні та седативні засоби. Код ATXN05C M.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Трава, кореневища та корені півонії незвичайної містять феноли, дубильні речовини, органічні кислоти. Півонії настойка має спазмолітичні, протисудомні властивості, здатність підвищувати кислотність шлунка та опір організму до гіпоксії.

Фармакокінетика.

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Функціональні порушення центральної нервової системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, невротичні стани).

Протипоказання.

Артеріальна гіпотензія. Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин, що містяться у лікарській рослинній сировині.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію седативних та снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків, антидепресантів із седативною дією.

Особливості застосування.

При тривалому прийомі великих доз препарату необхідно контролювати кислотність шлунка у пацієнтів з тенденцією до її підвищення.

Перед застосуванням збовтати.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано застосовувати препарат у період вагітності (діє абортивно) або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

У період лікування слід утримуватися від керування автотранспортними засобами або виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидкості психічних і рухових реакцій.

Спосіб застосування та дози.

Приймати внутрішньо за 10-15 хв до їди. Дорослим призначати по 15-20 крапель настойки 2-3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2-3 місяці).

Діти.

Препарат не застосовувати у педіатричній практиці.

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються сонливість, зниження артеріального тиску, запаморочення.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і призначити симптоматичну терапію (відповідно до клінічного стану хворого).

Побічні реакції.

З боку центральної нервової системи: сонливість, загальна слабкість.

З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія.

Місцеві алергічні реакції: гіперемія та висипання на шкірі, свербіж.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах або банках.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ПАТ «Біолік».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.