

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ
(ANETHI GRAVEOLENTIS FRUCTUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: кропу пахучого плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Окремі напівплодики (мерикарпії), іноді цілісні плоди (вислоплодники) зеленувато-бурого або бурого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Антацидні, противиразкові і вітрогінні засоби.

Код АТС А02Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, спазмолітичну, сечогінну і вітрогінну дію; підвищують секрецію шлункових залоз, регулюють моторику кишечника, проявляють відхаркувальні властивості.

Показання для застосування.

Метеоризм; запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано у період вагітності. Підвищує лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 6 місяців.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по 1/5 склянки; при захворюваннях верхніх дихальних шляхів 4-5 разів на добу – по 1/2-1 столовій ложці. Дітям віком 7-14 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці, дітям від 6 місяців до 3 років – по 1/2 чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.