

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

АСПАРКАМ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить магнію аспарагіату 0,175 г, калію аспарагіату 0,175 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, крохмаль кукурудзяний, кальцію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки білого або майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою та рисою. На поверхні таблеток допускається мармуровість.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».

Україна, 91019, м. Луганськ, вул. Кірова, 17.

Фармакотерапевтична група. Мінеральні добавки. Код АТС А12С.

Антиаритмічний засіб, що усуває дефіцит магнію і калію. Препарат відновлює електролітний баланс в організмі, поліпшує обмін речовин у міокарді і коронарний кровообіг, має протиаритмічні властивості, дещо пригнічує атріовентрикулярну провідність, а також знижує підвищену чутливість до серцевих глікозидів і зменшує прояви їх токсичності.

Показання для застосування. Дефіцит магнію і калію в організмі. У складі комплексної терапії при ішемічній хворобі серця, аритміях, зумовлених електролітними порушеннями, шлуночковій екстрасистолії (у тому числі при інфаркті міокарда, передозуванні серцевих глікозидів), а також для профілактики інтоксикації серцевими глікозидами.

Противпоказання. Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Гостра та хронічна ниркова недостатність. Недостатність кори надниркових залоз. Хвороба Аддісона. Атріовентрикулярна блокада III ступеня. Кардіогенний шок (сistolічний артеріальний тиск нижче, ніж 90 мм рт. ст.). Гіперкаліємія, гіпермагніємія.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Необхідно звертати особливу увагу на хворих із високим ризиком розвитку гіперкаліємії. У таких випадках необхідно регулярно контролювати показники електролітного гомеостазу та дані ЕКГ.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю препарат застосовують тільки у випадку, коли очікувана користь переважає потенційний ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами.

Діти. Клінічні дані щодо схем і доз застосування Аспаркаму для лікування дітей відсутні.

Спосіб застосування та дози. Приймають внутрішньо, після їди, по 2 таблетки 3 рази на день.

З метою профілактики або при підтримуючій терапії – по 1 таблетці 3 рази на день. Тривалість курсу терапії встановлюють індивідуально.

Передозування.

Симптоми гіперкаліємії і гіпермагніємії: брадикардія, аритмія, пригнічення дихання, гіпорексія, дезорієнтація, почервоніння обличчя, спрага, зниження артеріального тиску, біль у животі, параліч м'язів, металевий присмак у роті, скутість і парестезії у кінцівках, на електрокардіограмі реєструється підвищення висоти зубця Т, зниження амплітуди зубця Р, розширення комплексу QRS.

Лікування: промивання шлунка та парентеральне введення препаратів кальцію, симптоматична терапія.

Побічні ефекти. *Серцево-судинна система:* порушення провідності міокарда, зниження артеріального тиску, атріовентрикулярна блокада.

Нервова система: гіпорексія, парестезії.

Травна система: діарея, нудота, блювання, неприємні відчуття або печіння в епігастральній ділянці, абдомінальний біль, виразка слизової оболонки травного тракту, кровотеча з органів травного тракту, сухість у роті.

Алергічні реакції: в осіб із підвищеною чутливістю можливий розвиток алергічних реакцій – свербіж, почервоніння шкіри, висипання.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат поліпшує переносимість серцевих глікозидів. При одночасному застосуванні з калійзберігаючими діуретиками та інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту підвищується ризик розвитку гіперкаліємії, у зв'язку з чим необхідний контроль рівня калію у плазмі крові.

Гальмує всмоктування пероральних форм тетрацикліну, солей заліза і фториду натрію (необхідно дотримуватися тригодинного інтервалу між прийомами).

При одночасному застосуванні з інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту, бета-адреноблокаторами, циклоспорином, калійзберігаючими діуретиками, гепарином, нестероїдними протизапальними засобами підсилюється пригнічувальний вплив на перистальтику кишечника.

При одночасному застосуванні з антидеполяризуючими міорелаксантами підсилюється нервово-м'язова блокада, із засобами для наркозу – пригнічується центральна нервова система.

Препарат знижує ефективність серцевих глікозидів, неоміцину, поліміксину В, тетрацикліну і стрептоміцину.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Спеціальні умови зберігання не потрібні. Для захисту від дії вологи зберігати в оригінальному пакуванні.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Таблетки № 10, № 50, № 10x5 у блістерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.