

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: настійки плодів перцю стручкового дрібно порізаних (*Capsici fructus*) (1:10)
(екстрагент-етанол:90 %) 50 мл;
допоміжні речовини: відсутні.

Лікарська форма. Настійка.

Рідина жовтувато-оранжевого або червонувато-оранжевого кольору.

Назва і місце знаходження виробника.

ПАТ «Фітофарм».
Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.
Код АТС M02A B.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах перцю стручкового (ароматичний амін, капсаїцин, олія ефірна), мають місцевоподразнювальні властивості при нанесенні на шкіру діють подібно до гірчичника.

Показання для застосування.

Перцю стручкового настійку застосовувати як місцевий подразнювальний та відволікаючий засіб при міалгіях, невралгіях, люмбаго, артритах, ревматизмі.

Протипоказання.

Індивідуальна непереносимість будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води. Не наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або на ушкоджену шкіру.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та клінічна ефективність настійки у період вагітності або годування груддю не вивчалися, тому в цей період препарат не слід застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не досліджена.

Діти.

Безпека та ефективність застосування препарату дітям не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не слід призначати.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати зовнішньо дорослим та дітям віком від 12 років.

Настійкою розтирати болючі місця 1-2 рази на добу до появи в них відчуття тепла або лег-кого поколювання. Для посилення дії препарату рекомендується сухе зігріваюче закутування болючих місць.

Тривалість застосування препарату залежить від ступеня запального процесу та чутливості шкіри хворого до препарату.

Передозування.

Випадки передозування не спостерігалися.

Побічні ефекти.

В окремих випадках при індивідуальній підвищеній чутливості можлива поява алергічних реакцій: відчуття жару, печіння, почервоніння шкіри, висипання на місці нанесення, свербіж та злущування шкіри.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково слід порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності. 4 роки.

Не можна застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.